

Bewilligungserweiterungen

Herbizide	Fungizide	Insektizide
Cargon [®] S	Armicarb [®]	Gazelle [®] SG
Colzaphen [®]	Amistar [®]	Surround [®]
Golaprex [®] Basic	Stamina S [®]	
Select [®]		

Neu bewilligt in **Süßkartoffel**

Anwendung: 0,25 l/ha unmittelbar nach der Pflanzung.

Neu bewilligt in **Zucchini**

Anwendung: 0,25 l/ha unmittelbar nach der Pflanzung.



Colzaphen®

(38.6% Pethoxamid +
2.4% Clomazone)



Neu bewilligt in **Eiweisserbsen**

Anwendung: 3.0 l/ha unmittelbar nach der Saat.

Neu bewilligt in **Sojabohnen**

Anwendung: 3.0 l/ha unmittelbar nach der Saat.



Golaprex[®] Basic (800 g/l Prosulfocarb)



Neu bewilligt in Schnittlauch

5 l/ha. 10-14 Tage nach Pflanzung nur für die Bulbenanzucht

Neu bewilligt in Knoblauch und Schalotten

4 l/ha im Nachauflauf im Stadium 11-13.

Wartefrist: 60 Tage.

Neu bewilligt in Lupinen

5 l/ha im Voraufbau bis 5 Tage nach der Saat



Neu bewilligt in Spargeln 0.75 l/ha gegen einjährige Ungräser
Anwendung: nach der Stechperiode

Neu bewilligt in Randen 0.5 l/ha gegen einjährige Unkräuter
1.0 l/ha gegen Quecken, Ausfallgetreide
Wartefrist: 60 Tage

Neu bewilligt in Küchenkräutern (Estragon, Petersilie, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch Thymian) 0.5 l/ha gegen einjährige Ungräser
Wartefrist: 60 Tage

Nachauflauf nach dem Pflanzen oder nach dem Wiederaustrieb bei etablierten Kulturen

Neu bewilligt in Bäumen und Sträuchern 0.5 l/ha gegen einjährige Ungräser

Neu bewilligt zur Fruchtausdünnung in Aprikose

2 x 10-15 kg/ha

Anwendung: 2 Applikationen innerhalb von 3-5 Tagen.

1. Behandlung bei 60% Vollblüte
2. Behandlung nach 3 Tagen.



Neu bewilligt in Ribesarten, Rubusarten, Mini-Kiwi, Gojibeere und Heidelbeeren

3-4 kg/ha gegen Echten Mehltau

Anwendung: bei Befallsgefahr, alle 8-12 Tage.

Wartefrist: 3 Tage.

Amistar[®]

(250g/l Azoxistrobin)



Neu bewilligt in Asia-Salate

1 l/ha gegen Blattfleckenpilze

Anwendung: Ab Stadium 3-Blatt

Wartefrist: 7 Tage



Neu bewilligt in Brombeeren und

Himbeere

0.25 kg/ha gegen Gallmücken

Anwendung vor der Blüte oder nach der Ernte,
max. 2 x / Saison

Neu bewilligt in Portulak

0.25 kg/ha gegen Blattläuse

Anwendung: Bei Befallsbeginn,
Wartefrist: 7 Tage.

Neu bewilligt gegen KEF im Weinbau

Dosierung 2%, 24 kg/ha

Anwendung 1-2 Behandlungen, ab Mitte des Farbumschlags
(BBCH 83) oder bei den ersten Eiablage

Sehr gute Nebeneffekte gegen Botrytis, Vogel- und Wespenfrass!

