
Starane[®] Max

**Nachauflaufherbizid für Getreide,
Mais, Grasbestände für die
Saatgutproduktion, Zwiebeln und
Rasen.**

Nachauflaufherbizid für Getreide, Mais, Grasbestände für die Saatgutproduktion, Zwiebeln und Rasen.



W-7202

Wirkstoff	Fluroxypyr (333 g/l)
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)
Chem. Gruppe	Picolinsäuren
Gebindegrösse	1 l (12 x 1l) und 5 l (4 x 5 l)



Getreide

Bis 0.54 l/ha vom Stadium 2-Blatt bis zum Stadium Fahnenblatt sichtbar BBCH39.

0.4-0.54 l/ha in Mischung mit anderen Herbiziden wie Concert SX

Mais

0.3-0.54 l/ha gegen einjährige Unkräuter im Stadium Einblatt (BBCH11) bis zum Stadium 6-Blatt des Mais (BBCH16). (Speziell gegen Klee und Löwenzahn in Frässaaten)

Grasbestände zur Saatgutproduktion

0.54 l/ha gegen einjährige Unkräuter im Stadium 3-Blatt (BBCH13) bis zum Stadium Beginn Schossen (BBCH30) der Gräser im Frühjahr.

Zwiebeln

Nur in Gemüse- und Speisezwiebeln (nicht in Bundzwiebeln).

1. Split mit 0.12 l/ha Starane Max im Stadium 2-3 Blatt der Zwiebeln.
2. Split mit 0.18 l/ha Starane Max im Stadium 4 Blatt der Zwiebeln.

Maximal 0.3 l/ha und Jahr. Nur wüchsige Kulturen mit intakter Wachssschicht behandeln.

Wir empfehlen Starane Max im ersten Split in Tankmischung mit 0.2 l/ha Bucril resp. im 2. Split in Tankmischung mit 0.4 l/ha Bucril anzuwenden.

Bei Mischungen mit Bucril Beratung anfordern!

Rasen

Dosierung: 0.54 l/ha gegen einjährige Unkräuter ab Stadium 3-Blatt (BBCH13) auf junge Unkräuter von März bis September.