



Berone®

Herbizid in Bohnen, Dresch- und Eiweisserbsen, Sojabohnen und Ackerbohnen

- Flexibel einsetzbar
 - Breites Wirkungsspektrum
 - Einfaches Handling
- Dosierung: 1 l/ha, Gebinde: 12x1 l



Calado®

Bodenherbizid in Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen und diversen anderen Kulturen (Chikoree, Ölkürbisse, Chinaschilf)


- Vielseitig einsetzbar und kombinierbar
 - Speziell gegen Amarant und alle Hirsenarten
- Dosierung: 1–1.5 l/ha, Gebinde: 4x3 l



Citadel®

Bodenherbizid im Weinbau mit langer Wirkungsdauer

- Residualwirkung gegen Hirsen
 - Neue Mischung bekannter Wirkstoffe
 - Mischbar mit blattwirksamen Produkten
- Dosierung: 4 l/ha in Mischung mit 2.0 l/ha Roundup PowerMax, Gebinde: 4x5 l



Checkmate® Puffer Viti

Neue Verwirrungstechnik mit Puffer – nun auch im Weinbau

- Grosse Arbeitseinsparung
 - Kontrollierte Pheromonabgabe, nur abends, während dem Falterflug
 - Kein Abfall im Weinberg und im Erntegut
- Dosierung: 2–3 Puffer pro ha



Natrel®

Herbizid auf natürlicher Basis (Pelargonsäure) für Obst- und Weinbau sowie zur Krautvernichtung von Kartoffeln

- Sehr rascher Abbau im Boden
 - Reine Kontaktwirkung
 - Keine Gewässerschutzauflage
- Dosierung: 16 l/ha, Gebinde: 2x10 l





Novagib®

Vorbeugende Wirkung gegen Fruchtberostung der Äpfel

- Bessere Fruchtqualität
- Verbessert Fruchtgrösse und -länge und beschleunigt die Reifung
- Minimale Beeinträchtigung der Blüte im Folgejahr

Dosierung: 0.5 l/ha ab Ende Blüte, Gebinde: 12×1 l

Neu im Sortiment von Stähler Suisse

Dacthal® SC (4×5 l)

Herbizid in Ackerbohnen, Erbsen, Karotten, Kartoffeln, Knollenfenchel, Knoblauch, Linsen, Schalotten, Sonnenblumen Sellerie und Zwiebeln

Tarak® (4×5 l, 15 l)

Bodenherbizid im Getreide für Herbstanwendung im Vor- oder Nachauflauf

Bewilligungserweiterungen

Cargon S®

In Schwarzwurzeln, Petersilie

Amistar®

In Lupinen gegen Athraknose

Armicarb®

Blüten- und Zweigdürre und Fruchtmonilia in Pfirsich und Nektarine

Echter Mehltau in Blattkohle, Kopfkohle, Kohlrabi, Erbsen mit Hülsen, Knollensellerie, Pastinake, Stangensellerie, Wurzelpetersilie und allen Kürbisgewächsen

Stemphylium botryosum in Knoblauch, Schalotten, Spargel

Avatar®

Botrytis im Schwarzen Holunder, Botrytis und Colletotrichum in Mini-Kiwi

Captan S® WG

Rutenkrankheit in Himbeeren, Brombeeren. Godronia-Triebsterben in Heidelbeere.

Fusarium spp. in Tulpen. Graufäule (Botrytis cinerea) in Anemonen und Ranunkel

Gazelle® SG

Weisse Fliege in Kopfkohlen, Broccoli, Romanesco

Walnussfliege in Walnuss

Diverse

Das Brotgetreide Korn (Dinkel) ist neu unter Weizen gruppiert. Alle PSM, welche in Weizen bewilligt sind, können nun auch im Dinkel angewendet werden (Concert SX, Talis, Starane Max, u.a.).

Neue Gebinde

Duotop® Plus 4×5 kg, **Atollan®** 4×5 kg, **Oxykupfer 35** 4×5 kg, **Tarak®** 4×5 und 15 l