

Calshine®



Calshine =

Calcium in Chelatform

+ *Komponenten, welche die Aufnahme verbessern*

+ *Komponenten, welche aktiv den Zellwandaufbau fördern*

Bisher im Obstbau mit grossem Erfolg eingesetzt.

Neue Versuche der Firma Stähler zeigten, dass Calshine auch in anderen Kulturen sehr gute Resultate bringt:

Calshine®

- **Gegen Stiehlähme im Weinbau**
- **Dosierung:** 3 l/ha
- **Anwendung:**
 - Direkt in die Traubenzone
 - Behandlung mit 3 l/ha Calshine bei einem Zuckergehalt von 30° Oechsle, gleichzeitig mit der Botrytisbehandlung (Frupica SC oder Cercobin)
 - Gefolgt von einer Behandlung bei einem Zuckergehalt von 50° Oechsle mit 20 kg/ha Bittersalz in die Traubenzone

Vorteil: 1 Arbeitsgang weniger



- **Qualitätssicherung bei Kohlgewächsen**
- **Dosierung:** 2.5 l/ha
- **Anwendung:** - Erste Behandlung bei Beginn der Kopfbildung (BBCH 41)
- 4-5 weitere Behandlungen im Abstand von 10-12 Tagen
bis 3 Wochen vor der Ernte

Vorteile: Weniger Lagerverlust, Besseres Kopfgewicht, weniger Abfall

