


Xilin[®] Larvizid

Gegen Larven der Stallfliegen



Xilin[®] Larvizid - Übersicht

- **Flüssiges Insektizid gegen Fliegenlarven**
- **Wirkungsweise:** Häutungshemmer
- **Wirkstoff:** Diflubenzuron (150 g/l)
- **Formulierung:** Suspensionskonzentrat (SC)

- **Applikation:**

Xilin Larvizid wird direkt auf den Boden eingesetzt:

- Spritzbehandlung mit Rückenspritze: 75 ml in 2 l Wasser für 10 m² Fläche
 - Giessbehandlung mit Spritzkanne: 75 ml in 5 l Wasser für 10 m² Fläche
- **Lieferant:** Kwizda, Frankreich



Xilin® Larvizid - Anwendung

- **Anwendung:**

März/April bis Oktober zur vorbeugenden Eindämmung von Fliegenbefall

- Erste Behandlung vor dem Einstellen respektive nach dem Entmisten
- Zweite Behandlung ca. 2 Wochen später. Je nach Temperatur, Jahreszeit und Fliegenbefall weitere Behandlungen ca. alle 4 Wochen
- Wirkungsdauer: 3-4 Wochen
- Immer vor dem Einstellen und nach der Reinigung einsetzen

- **Antiresistenzstrategie:**

Im Sinne einer erfolgreichen Strategie zur Fliegenbekämpfung soll Xilin Larvizid immer gleichzeitig in Kombination mit Produkten gegen adulte Fliegen (Xilin Power, Lexan Royal, Lexan G) ausgebracht werden.



Warum Xilin® Larvizid?

- Xilin Larvizid vervollständigt das Fliegenprogramm von Stähler
- Einfach in der Anwendung
- Erfolgreiche Fliegenbekämpfung beginnt mit einem Larvizid

