



Cycocel® Extra

Wachstumsregulator gegen Lagerung bei Getreide

Was ist Cycocel Extra?

Wachstumsregulator gegen Lagerung und Ährenknicken bei allen Getreidearten.

Wirkstoffe

460 g/l Chlormequat (Chlorcholinchlorid, CCC)
322 g/l Cholinchlorid (CC)

Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

Hersteller

BASF, Deutschland

Wie wirkt Cycocel Extra?

Die Wirkstoffe verhindern die Synthese der für das Längenwachstum verantwortlichen pflanzeigenen Gibberellinsäuren (Wachstumshormone). Die Wirkstoffe verlangsamen das Längenwachstum der Zellen und verursachen dadurch eine Reduktion der Halmlänge. Zudem werden die Halmwände verstärkt, was zu einer Kräftigung und zu einer verbesserten Standfestigkeit der Getreidepflanzen führt.

Wie wird Cycocel Extra im Getreidebau angewendet?

Winter-Weizen: optimales Anwendungsstadium BBCH 30 (Ähre 1 cm), mögliches Anwendungsstadium BBCH 25-30, Dosierung: 1.0 – 1.5 l/ha, je nach Sorte.

Nach einer Erstbehandlung mit Cycocel Extra kann eine Folgebehandlung mit einer einmaligen Splitdosierung mit 0.5 l/ha Medax Top + Turbo im Stadium BBCH 32-39 erfolgen.

Sommer-Weizen: optimales Anwendungsstadium BBCH 30 (Ähre 1 cm), mögliche Anwendung von BBCH 25-30, Dosierung: 0.8 – 1.2 l/ha, je nach Sorte.

Triticale: optimales Anwendungsstadium BBCH 30 (Ähre 1 cm), mögliche Anwendung von BBCH 25-30, Dosierung: 0.5 – 1.5 l/ha, je nach Sorte.

Korn (Dinkel): optimales Anwendungsstadium BBCH 30 (Ähre 1 cm), mögliche Anwendung von BBCH 25-30, Dosierung: 1.0–2.0 l/ha, je nach Sorte.

Hafer: optimales Anwendungsstadium BBCH 37 (Erscheinen des letzten Blattes). Dosierung 2.5-3.5 l/ha.

Wann darf Cycocel Extra nicht eingesetzt werden?

Cycocel Extra bei hohen Lufttemperaturen nur am Abend oder am frühen Morgen applizieren. Nicht bei grosser Hitze spritzen!

Mischbarkeit

Cycocel-Extra ist mischbar mit unseren Fungiziden: Amistar, Capitan S, Opus. Cycocel-Extra ist mit folgenden Herbiziden mischbar: Concert SX, Starane 180, Ally SX, Ally Class, Lexus Class, Exelor, Trifolin Trioflex. In Kombination mit Trifolin ist die Dosierung von Cycocel Extra um 50%, mit den übrigen Herbiziden um 30% zu reduzieren. Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung.

Nützlingsverhalten

Cycocel Extra zeigt ein positives Umweltverhalten und ist nicht schädigend für Nützlinge im Getreidebau.

IP (ÖLN)

Cycocel Extra darf in der IP (ÖLN) nur für die Saatgetreideproduktion eingesetzt werden.

Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 2 Stunden nach der Behandlung fallen.

Wichtig zu wissen

Cycocel-Extra ist flüssig und löst sich problemlos im Wasser. Cycocel-Extra ist absolut pflanzenverträglich. Cycocel Extra baut sich im Boden innerhalb von wenigen Tagen vollständig ab (DT50 < 12 Tage).

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

S35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Packungsgrösse

Packungen zu 5 l und 10 l
Kartons zu 4 x 4 l und 2 x 10 l

Kontakt

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tel: 062 746 80 00
Fax: 062 746 80 08
E-Mail: info@staehler.ch
Homepage: <http://www.staehler.ch>