



# Cyflamid®

**Fungizid mit vorbeugender und abstoppende Wirkung gegen Echten Mehltau im Obstbau, Weinbau und im Getreide**

## Was ist Cyflamid?

Cyflamid ist ein systemisch wirkendes Fungizid und wirkt vorbeugend und abstoppend gegen Echten Mehltau an Äpfeln, Birnen, Weinbau und im Getreide.

## Wirkstoff

53.2 g/l Cyflufenamid (5%)

## Formulierung

Emulsion Öl in Wasser (EW)

## Hersteller

Nippon Soda Co., Ltd, Japan

## Wie wirkt Cyflamid?

Cyflufenamid ist ein neuer Wirkstoff und gehört zur Gruppe der Amidoxime. Der Wirkstoff dringt rasch ins Blattgewebe ein, ist translaminar und verteilt sich im behandelten Blatt und wirkt vorbeugend und abstoppend gegen Apfelmehltau. Cyflamid hat eine lange Wirkungsdauer von bis zu 4 Wochen. Durch die zusätzliche Dampfphase dringt der Wirkstoff nach der Behandlung auch in dichtes Blattwerk, verteilt sich dort und sorgt damit für verbesserten Schutz. Cyflufenamid zeigt keine Kreuzresistenz mit anderen, bekannten Wirkstoffen wie Triazole, Morpholine, Quinoxifen oder Strobilurine.

## Wie wird Cyflamid angewendet?

**Anwendung gegen Echten Mehltau an Äpfeln und Birnen: Dosierung 0.031% (0.5 l/ha)** bei einem Baumvolumen von 10'000 m<sup>3</sup>/ha und einer Wassermenge von 1600 l/ha. Behandlungen vom Rotknospenstadium (BBCH 57) bis Ende Juli. Um eine eventuelle Resistenz zu vermeiden ist die Anwendung von Cyflamid auf 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr limitiert. Deshalb wird empfohlen Cyflamid abwechselnd mit Nustar 20 DF, Stroby, Suffralo oder einem anderen Mehlaufungizid einzusetzen. Die Spritzabstände sind der Witterung und dem Mehldruck anzupassen. Wartefrist 3 Wochen.

**Anwendung gegen Echten Mehltau im Weinbau: Dosierung 0.03% (0.24-0.48 l/ha).** Cyflamid kann in der Vorblüte bis spätestens Mitte August maximal zweimal eingesetzt werden. Cyflamid abwechslungsweise mit Stroby, Talendo Olymp 10 EW oder anderem Echten

Mehltaumittel einsetzen. Empfehlungen der kantonalen Warndienste und von ACW beachten.

**Anwendung gegen Getreidemehltau an Weizen, Roggen, Gerste, Triticale:** Einmalige Behandlung mit **0.25 l/ha** bei Befallsbeginn gegen Getreidemehltau im Stadium BBCH 31 bis Beginn der Blüte (BBCH 61, Gerste nur bis BBCH 51), wenn mehr als 20% der obersten 3 vollentwickelten Blätter der Haupttriebe Befall aufweisen.

## Wann darf Cyflamid nicht angewendet werden?

Zur Verhinderung von Resistenzbildung darf Cyflamid im Obstbau und im Weinbau nur zweimal eingesetzt werden.

## Mischbarkeit

Im Obstbau ist Cyflamid mischbar mit unseren Schorf-Fungiziden, im Weinbau mit unseren Fungiziden gegen Falschen Mehltau sowie mit unseren Insektiziden und mit Goëmar-Produkten. Auflagen der Mischpartner beachten!

## Nützlingsverhalten

Cyflamid zeigt ein positives Umweltverhalten und ist nicht schädigend für Raubmilben, Regenwürmer, Bienen und andere Nützlinge.

## IP (ÖLN)

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

## Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 2 Stunden nach der Behandlung fallen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

**R38** Reizt die Haut

**R50/53** Sehr giftig für Wasserorganismen; kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

**R65** Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

**S02** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**S13** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**S24** Berührung mit der Haut vermeiden

**S37/39** Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen

**S46** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**S57** Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

**S60** Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen

## Gefahrensymbole



**Xn**

Gesundheitsschädlich



**N**

Umweltgefährlich

## Packungsgrösse

Packungen zu 1 l

Kartons zu 12 x 1 l

## Kontakt

Stähler Suisse SA

Henzmannstrasse 17 A

4800 Zofingen

Tel: 062 746 80 00

Fax: 062 746 80 08

E-Mail: [info@staehler.ch](mailto:info@staehler.ch)

Homepage: <http://www.staehler.ch>

# Mehltaustrategie im Obstbau mit Cyflamid

Bemerkungen	Vorblüte	Blüte	Triebabschluss
<b>Hoher Mehldruck</b>			
Mehltau Zur Schorfbekämpfung in Tankmischung mit Captan S WG oder Delan WG		Cyflamid (Bei hohem Mehldruck maximal 2x mit 0.5 l/ha im Abstand von ca. 8-12	
Mehltau Vor- oder nach Cyflamidbehandlung mit gleichzeitiger Schorfwirkung		<sup>1</sup> Duotop, Nustar 20 DF oder Stroby WG	
<b>Niedriger Mehldruck</b>			
Mehltau Zur Schorfbekämpfung in Tankmischung mit Captan S WG oder Delan WG		Sufralo	

<sup>1</sup> Erwähnte Produkte mit Captan S WG oder Delan WG mischen.