



Daconil® Combi DF

Teilsystemisches Kontaktfungizid gegen Kraut- und Knollenfäule und gegen Alternaria an Kartoffeln

Was ist Daconil Combi DF?

Daconil Combi DF ist ein Fungizid mit zwei sich ergänzenden Wirkstoffen. Daconil Combi DF wirkt gegen Kraut- und Knollenfäule und gegen Alternaria-Dürffleckenkrankheit an Kartoffeln.

Wirkstoffe

60% Chlorothalonil
6% Cymoxanil

Formulierung

Wasserdispergierbares Granulat (WG)

Hersteller

Stähler Suisse SA

Wie wirkt Daconil Combi DF?

Der Wirkstoff **Chlorothalonil** gehört zur Familie der Chloronitrile. Chlorothalonil ist ein sogenanntes "multi-site" Kontaktfungizid, welches verschiedene wichtige Enzyme der Schadpilzsporen stört und dadurch deren Keimung verhindert. Gegenüber Chlorothalonil sind bis anhin noch nie Resistenzen aufgetreten.

Cymoxanil gehört zu den Acetamiden und wird durch vier verschiedene Wirkmechanismen charakterisiert:

1. Kontaktwirkung, verhindern der Sporenkeimung
2. Translaminare Wirkung, Cymoxanil dringt ins Blatt ein und wirkt bis auf die Blattunterseite. Im Blattgewebe wirkt Cymoxanil bis 3 Tage nach Infektion.
3. Stoppende Wirkung im Blattinnern
4. Reduziert die Sporenbildung.

Cymoxanil dringt ins Blattgewebe ein und zerstört dort den Falschen Mehltau Pilz bis 3 Tage nach erfolgter Infektion. Cymoxanil hat teilsystemische Eigenschaften, der Wirkstoff verteilt sich im behandelten Blatt und dringt auch auf die Blattunterseite.

Die Kombination eines vorbeugenden (protektiven) mit einem abstoppenden (kurativen) Wirkstoffs ergibt eine zuverlässige Wirkung mit einer langen Schutzdauer gegen die wichtigsten Kartoffelkrankheiten Kraut- und Knollenfäule und Alternaria.

Wie wird Daconil Combi DF angewendet?

Kartoffeln: 2.0 kg/ha gegen Kraut- und Knollenfäule und gegen Alternaria-Dürffleckenkrankheit. Erste Behandlung bei Befallsgefahr oder wenn sich die Stauden in den Reihen berühren. Behandlungen alle 7-10 Tage wiederholen. Wartefrist 3 Wochen (Frühkartoffeln 2 Wochen vor der Ernte). Zum Zeitpunkt des stärksten Staudenwachstums kann Daconil Combi DF durch maximal 3 Behandlungen mit 1.6 kg/ha Valbon und/oder 3 Behandlungen mit 2.5 kg/ha Fantic M ersetzt werden. Anschliessend mit Daconil Combi DF fortfahren.

Mischbarkeit

Daconil Combi DF ist mischbar mit den Herbiziden Dancor und Titus + Exell, mit den Insektiziden Nomolt und Gazelle sowie mit Goëmar Produkten. Auflagen der Mischpartner beachten.

Nützlingsverhalten

Daconil Combi DF zeigt ein positives Umweltverhalten und ist nicht schädigend für Raubmilben, Regenwürmer, Bienen und andere Nützlinge.

IP (ÖLN)

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

Niederschläge nach der Behandlung

Die Wirkung wird durch Niederschläge nicht beeinträchtigt, wenn diese später als 4 Stunden nach der Behandlung fallen. Daconil Combi DF zeichnet sich durch eine sehr gute Regenfestigkeit aus.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigefügte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Fischgift.

R37 Reizt die Atmungsorgane

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung

R41 Gefahr ernster Augenschäden

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

S01/02 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich

aufbewahren

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

S57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden

S60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Gefahrensymbole



Xn

Gesundheitsschädlich



N

Umweltgefährlich

Packungsgrösse

Packungen zu 2 kg

Kartons zu 6 x 2 kg

Kontakt








Stähler Suisse SA; Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen

Tel: 062 746 80 00; Fax: 062 746 80 08

E-Mail: info@staehler.ch

Homepage: <http://www.staehler.ch>

Einsatzstrategie für Daconil Combi DF in Kartoffeln

Stadium							
Stadium	Blatt- und Stängel-Ausbildung	Längen-Wachstum	Schliessen des Bestandes	Knospen-Bildung	Blüte	Ausbildung der Beeren	Abreife
Stark anfällige Sorten, gegen Kraut- und Knollen-Fäule und Alternaria		3 x Daconil Combi DF alle 7-10 Tage	3 x Valbon alle 7-10 Tage	3 x Valbon alle 7-10 Tage	2-3 x Daconil Combi DF alle 7-10 Tage	2-3 x Daconil Combi DF alle 7-10 Tage	
weniger anfällige Sorten, gegen Kraut- und Knollen-Fäule und Alternaria		2 x Daconil Combi DF alle 7-14 Tage	2-3 x Valbon alle 7-14 Tage	2-3 x Valbon alle 7-14 Tage	2-3 x Daconil Combi DF alle 7-14 Tage	2-3 x Daconil Combi DF alle 7-14 Tage	