



## Apfel/Birne

### Verschiedenes

Netzmittel für Fungizide und Insektizide

Gegen Berostung der Sorte Golden Delicious (Apfel)

Gegen Stippe, verbessert Qualitätseigenschaften (Apfel, Birne)

Pflanzenaktivator, bessere Fruchtgrösse (Apfel, Birne)

Ausdünnung, Alternanzbrechung (Apfel)

Gegen vorzeitigen Fruchtfall (Apfel)

### Austriebstadium

A

B

C

D

E

Blüte

Mai

Juni

Juli

August

### Sticker

0,1 l/100 l Wasser (max. 0,5 l/ha)

Erste Behandlung beim Abblühen. Folgebehandlungen 3 × im Abstand von 10 Tagen, bis max. 30 Tage nach der Blüte.

**Pro Gibb 47**  
0,4–0,8 l/ha

Je nach Sorte und Behang 2–6 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen bis 2 Wochen vor der Ernte. Wartefrist 14 Tage.

**Calshine**  
2,4 l/ha

**Goëmar Start**  
3 × 2 l/ha

1 × Ballonstadium, 1 × Vollblüte, 1 × abgehende Blüte.

Wenn ca. ⅓ der Blütenblätter abgefallen sind. Optimales Klima: 12–15 °C, hohe Luftfeuchtigkeit, windstill. Nicht bei Gala und Braeburn!

**Dirigol N**  
200–400 g/ha

Bei anfälligen Sorten 5 Wochen, 3 Wochen und 10 Tage vor der Ernte. Wartefrist 10 Tage. Nicht bei Gala und Braeburn!

**Dirigol N**  
200 g/ha

	Austriebstadium					Blüte	Mai	Juni	Juli	August
	A	B	C	D	E					
Blatt-Volldünger (Apfel, Birne)						<b>Flüssigdünger S</b> 6 l/ha		1 × Vorblüte, 1 × Blüte, 1 × Nachblüte.		
Mäusebekämpfung (Apfel, Birne)	<b>Arvicolon</b> 6 kg/ha									
	Zur Mäusebekämpfung das ganze Jahr. Ca. 10 Köder pro Öffnung.									
<b>Wachstumsregulator</b>	<b>Anwendung von Dirigol N</b>									
Ausdünnung, Alternanzbrechung (Apfel)	<b>Apfelsorten</b>						<b>Pulverform</b>			
							g/100 l	g/ha		
	Jerseymac, Vistabella, Delcorf, Fiesta, Discovery (die meisten Frühsorten)						10	200		
	Cox Orange, Kidds Orange, Jonathan, Granny Smith						10	200		
	Primerouge, Boskoop, Glockenapfel, Goldparmäne, Idared						15	300		
	Rubinette, Jonagold, Gravensteiner, Pinova, Ariwa, Galmac, Mairac						15	300		
	Arlet, Summerred, Maigold, Spartan						20	400		
	Golden, Elstar, Iduna, Topaz						20	400		
<b>Wichtige Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Zur Fruchtausdünnung</b> in die abgehende Blüte spritzen, bis spätestens 1–2 Tage nach dem Abblühen (max. 5 mm Ø der Früchte). Allein mit 1000 l Wasser/ha einsetzen. Unbedingt Gebrauchsanweisung befolgen! Mit Ajutol (0,05 %) oder Exell (0,025 %) kann die Wirkung verstärkt werden.</li> </ul>									