



Aprikosen

Schutz vor Krankheiten

Gegen Kräuselkrankheit

Oxykupfer
0,2–0,3 % (3,2–4,8 kg/ha)
oder
Cupro FL
0,3 % (6 l/ha)
oder
Kocide 2000
6 kg/ha

Wenn Blütenknospen sich zu röten beginnen.
Mischbar mit Oleo Diazinon R.

NEU

Gegen Monilia

Cercobin
2 l/ha

Max. 2 Behandlungen während der Blüte.

Gegen Schrotschuss und Monilia (Blüten-, Zweig- und Fruchtfäule)

Slick
0,32 l/ha

oder **Amistar**
0,1 % (1,6 l/ha)

1. Behandlung in aufgehende Blüte.
2. Behandlung in volle bis abgehende Blüte.
3. Behandlung im Schornigelstadium.

Duotop
0,05 % (0,8 kg/ha)

+ **Captan S WG**
1,6 kg/ha

Blüten- und Zweigdürre

Armicarb
4,8 kg/ha

Gegen Schrotschuss

2–3 Behandlungen nach der Blüte.

Folpet 80 WG
0,125 % (2 kg/ha)

oder **Captan S WG**
2,4 kg/ha

Schutz vor Schädlingen

Gegen Blattläuse

Gazelle SG
0,015 % (240 g/ha)

Bei Befallsbeginn behandeln.

Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator

Goëmar Start
2 l/ha

3 Behandlungen bis Ende Blüte.