



## Gemüse Bohnen

### Unkrautbekämpfung

Vorauflaufbehandlung

### Centium 36 CS + Successor 600

0,25 l/ha + 2 l/ha

Sofort nach der Saat bis spätestens 3 Tage danach einsetzen.

Gegen aufgelaufene Gräser  
und Quecken

Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten auch  
mit 0,5 l/ha.

### Select + Zofal R

0,5–1 l/ha 1–2 l/ha

### Schutz vor Krankheiten

Bohnenbrand  
Fettfleckenkrankheit

Teilwirkung

### Oxykupfer oder Kocide 2000

0,2 % (2 kg/ha) 0,2 % (2 kg/ha)

**NEU**

Botrytis, Sclerotinia

Vor der Blüte behandeln. Max. 2 Behandlungen  
pro Saison.

### Frupica SC

0,1 % (1 l/ha)

oder

### Fezan

1 l/ha

**NEU**

Botrytis, Sclerotinia,  
Falscher Mehltau,  
Brennfleckenkrankheit

Vorbeugend einsetzen, max. 3 Behandlungen  
pro Jahr.

### Amistar

0,1 % (1 l/ha)

### Schutz vor Schädlingen

Bohnenfliege

### Novo Tak

0,1 % (1 l/ha)

Nach dem Säen behandeln und bewässern.

### Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator

Beeinflusst den gleichmässigen Blütenansatz.

### Goëmar Start

2 l/ha

Nachsaat

2–4-Blatt

6-Blatt

Vorblüte

Blüte