



# Bohnen und Ackerbohnen

	Nachsaat	2–4-Blatt	6-Blatt	Vorblüte	Blüte
<b>Unkrautbekämpfung</b>					
Nachsaatbehandlung	<b>Golaprex</b> 3 l/ha <b>Ackerbohnen:</b> Behandlung bis max. 3 Tage nach der Saat. Auf leichten, durchlässigen Böden nicht einsetzen. Saatgut muss vollständig gedeckt sein.				
Gegen aufgelaufene Gräser	<b>Centurion Prim oder Select + Zofal R</b> 1 l/ha                      0,5 l/ha                      1 l/ha				
<b>Schutz vor Krankheiten</b>					
Gegen Botrytis, Brennflecken, Echten Mehltau, Sclerotinia	Sortenanfälligkeit und Befallsgefahr beobachten. Mit Blattlausmitteln mischbar.			<b>Amistar</b> 1 l/ha oder <b>Frupica SC</b> 1 l/ha	
<b>Schutz vor Schädlingen</b>					
Gegen Schnecken	<b>T-Rex</b> 5 kg/ha		Je nach Witterung und Schneckenpopulation muss mehrmals behandelt werden.		
<b>Ernährungsoptimierung</b>					
Pflanzenaktivator				<b>Goëmar Top</b> 3 l/ha Für einen guten Blütenansatz.	
Ergänzungsdüngung				<b>Flüssigdünger S</b> 4 l/ha Bei ungleichem Wuchs einsetzen.	