



# Gemüse A–Z

## Buschbohnen

### Krankheiten

Botrytis, Sclerotinia,  
Falscher Mehltau

**Amistar** (14)  
0,1 % (1 l/ha)

Max. 1–2 Behandlungen pro Saison.

**Frupica SC** (14)  
0,1 % (1 l/ha)

Nicht gegen Mehltau.

## Fenchel

### Unkrautregulierung

Einjährige Unkräuter  
und Gräser

**Sitradol SC**  
2–4 l/ha

**Gesäter Fenchel:** Sofort bis 5 Tage nach der  
Saat auf feinen, mässig feuchten Boden.  
**Gepflanzter Fenchel:** Kurz vor dem Pflanzen.  
Auf leichten Böden 20 ml/a nicht überschreiten;  
auf Moorböden 40 ml/a einsetzen.

### Krankheiten

Falscher Mehltau,  
Cercospora, Ramularia

**Amistar** ①  
1 l/ha

Ab Befallsbeginn max. 3 Behandlungen.  
Wartefrist: 1 Woche.

## Gurken, Cornichons

### Krankheiten

Eckige Blattflecken, Falscher  
Mehltau

**Oxykupfer 50**  
0,2 % (2 kg/ha) oder

Vorsicht! Verbrennungsgefahr.

**Cupro FL**  
0,5 % (5 l/ha)

Bei Befallsgefahr alle 2–3 Wochen behandeln.  
Max. 3 Spritzungen. Wartefrist: 3 Tage.

Echter und Falscher Mehltau

**Amistar** ①  
0,1 % (1 l/ha) oder

**Stroby WG**  
0,03 % (0,3 kg/ha)

### Schädlinge

Blattläuse, Thrips, Weisse Fliege

**Talstar SC** (14)  
0,03 % (3 dl/ha)

Behandlung beim Auftreten durchführen.

## Karotten

### Unkrautregulierung

#### Im Vorauflauf

Einjährige Unkräuter  
und Gräser

**Sitradol SC  
+ Linutop**  
3–4 l/ha + 0,4–1 l/ha

Sofort nach der Saat bis 3 Tage danach, vor dem  
Auflaufen der Kultur.

#### Im frühen Nachauflauf

Einjährige Gräser und  
Samenunkräuter

**Sitradol SC** 1,5 l/ha  
**+ Linutop** 0,5 l/ha  
**+ Zofal R** 1 l/ha  
oder

Ab Keimblatt der Karotten einsetzen.  
2–3 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen.

**Linutop** 1,5 l/ha  
**+ Select** 0,5 l/ha  
**+ Zofal R** 0,5 l/ha

Nach 10 Tagen wiederholen.