



# Erdbeeren

## Schutz vor Unkräutern

### Im Voraufbau

speziell gegen Kamillen, Klebern, Gluren, Taubnesseln, Hirtentäschel  
Speziell gegen Hirsen

### Früher Nachaufbau

Nach dem Setzen 2–4 Behandlungen

### Im Nachaufbau

gegen ein- und mehrjährige Gräser

## Successor 600

2 l/ha

## Devrinol Plus

3–3,5 l/ha

## Beetup

3 l/ha

## Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Vor oder sofort nach dem Pflanzen behandeln.

4 Wochen nach der Pflanzung, dann beregnen (ca. 5 mm). Nicht auf Sand- und Moorböden einsetzen.

Splitbehandlung innerhalb von 4–8 Tagen wiederholen.

Hohe Dosierung gegen Quecken. Kann bis vor der Blüte oder nach der Ernte eingesetzt werden.

## Schutz vor Krankheiten

Gegen Rote Wurzelfäule und Rhizomfäule

Gegen Echten Mehltau

Gegen Echten Mehltau und Blattfleckenkrankheiten mit **guter Teilwirkung gegen Botrytis**

Gegen Graufäule (Botrytis)  
Wartefrist: 14 Tage

Eckige Blattflecken

## Alial 80 WG

0,75 % (7,5 kg/ha)

## Armicarb

5 kg/ha oder

## Slick

0,05 % (0,5 l/ha)

## Amistar®

0,1 % (1 l/ha) oder

## Stroby WG

0,03 % (300 g/ha)

## Frupica SC

0,1 % (1 l/ha)

## Oxykupfer

0,5 % (1–3 kg/ha) oder

## Cupro FL

0,45–0,75 % (3–5 l/ha) oder

## Kocide 2000

1,5–4 kg/ha

Im Giess- oder Spritzverfahren.

Regelmässige Behandlungen im Abstand von 8 Tagen durchführen.

Bei Befallsgefahr einsetzen, in regelmässigen Abständen von 10–14 Tagen wiederholen.  
Wartefrist: 2 Wochen. Max. 3 Behandlungen.

Behandlung ab Blütebeginn bis Ende Blüte resp. spätestens 14 Tage vor Erntebeginn.

**NEU**

**NEU**

## Schutz vor Schädlingen

Gegen Blattläuse und Thrips

Gegen Spinnmilben  
Mischbar mit unseren Fungiziden

## Pyrinex

0,15 % (1,5 l/ha)

## Trevi

1 kg/ha

Eine Behandlung vor der Blüte und/oder nach der Ernte.

## Wachstumsstörungen

Stimuliert die Nährstoffaufnahme und fördert den Fruchtansatz.

Gegen Chlorose und als Blattdüngung

Förderung des Fruchtzuckers

## Goëmar Start

2 l/ha

## Flüssigdünger S

4 l/ha

## Calshine

2 l/ha

**1** × Anfang Blüte, **1** × volle Blüte, **1** × auf grüne Früchte.

Mischbar mit Fungiziden und Goëmar-Spezialitäten.

2–3 Behandlungen durchführen. Wartefrist 3 Tage.