



Gemüse diverse

Fenchel

Unkrautregulierung

Einjährige Unkräuter und Gräser

Krankheiten

Falscher Mehltau, Cercospora, Ramularia

Sitradol SC

2–4 l/ha

Gesäter Fenchel: Sofort bis 5 Tage nach der Saat auf feinen, mässig feuchten Boden.

Gepflanzter Fenchel: Kurz vor dem Pflanzen. Auf leichten Böden 20 ml/a nicht überschreiten; auf Moorböden 40 ml/a einsetzen.

Ab Befallsbeginn max. 3 Behandlungen. Wartefrist: 1 Woche.

Amistar (7)

1 l/ha

Gurken, Cornichons

Krankheiten

Eckige Blattflecken, Falscher Mehltau

Oxykupfer 50 (3)

0,2 % (2 kg/ha) oder

Cupro FL (3)

0,5 % (5 l/ha)

Kocide 2000 (21)

0,2 % (2 kg/ha)

Vorsicht! Verbrennungsgefahr.

Bei Befallsgefahr alle 2–3 Wochen behandeln. Max. 3 Spritzungen. Wartefrist: 3 Tage.

NEU

Echter Mehltau

Armicarb (3)

0,5 % (5 kg/ha)

2–3 Behandlungen innert 7 Tagen. Wartefrist: 3 Tage.

Echter und Falscher Mehltau

Amistar (3)

0,1 % (1 l/ha) oder

Stroby WG (3)

0,03 % (0,3 kg/ha)

Gummistengelkrankheit

Slick (3)

0,05 % (0,5 l/ha)

Nur gedeckte Kulturen.

Schädlinge

Blattläuse, Thrips, Weisse Fliege

Talstar SC (14)

0,03 % (3 dl/ha)

Gazelle SG (3)

0,025 % (250 g/ha)

Behandlung beim Auftreten durchführen.

Kohlgewächse

Unkrautregulierung

Vor dem Pflanzen

Einjährige Unkräuter und Gräser

Sitradol SC

4–5 l/ha

Auf leichte und mittelschwere Böden 40 ml/a, auf schwere und humose Böden 50 ml/a.

Nach dem Pflanzen

Einjährige Unkräuter und Gräser

Devrinol Plus

4 l/ha oder

Centium 36 CS

0,25 l/ha

Nach dem Pflanzen spritzen und leicht einregnen.

Nach dem Pflanzen behandeln. Geeigneten Mischpartner zumischen.

NEU

Gegen Gräser

Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Gegen aufgelaufene Gräser.