



Haus und Hof

Gegen Larven der Stallfliegen

Xilin Larvizid

75 ml/10 m²

Spritzen: 75 ml auf 10 l Wasser.

Giessen: 75 ml auf 5 l Wasser.

1. Behandlung 3 Tage nach dem Einstallen.

Gegen Stallfliegen

Lexan Royal

für Spritzbehandlung
300 g/2 l Wasser

Für Streich- und Spritzbehandlungen mit langer Wirkung.

für Streichbehandlung
300 g/200 ml Wasser

Gegen Stallfliegen mit schneller Wirkung

Xilin Power

10 %

5 dl in 5 l Wasser reichen für ca. 100 m².

Ködergranulat gegen Fliegen

Lexan G

25 g/10 m²

Als Ergänzung zu Spritzbehandlungen.

Gegen Wühlmäuse im Obst- und Weinbau

Arvicolon 200 CT

Fertigköder

Auslegen von Hand oder mit dem Handlegegerät **Arvicolt**. Die Anwendung kann im Frühjahr, Sommer oder Herbst erfolgen.

Dosierung: Pro Kolonie an 5–7 Stellen etwa 10 Köder ablegen.

Gegen Hausmäuse und Ratten

Surux Flocken

und

Hausmäuse: 30–40 g Surux Flocken auslegen (ca. 4 Esslöffel).

Surux Körner

oder

Ratten: 50–100 g Surux (vorzugsweise Körner, da diese gegen Feuchtigkeit imprägniert sind).

Für feuchte Räume

Surux Rattenring

oder

Entlang der von Ratten belauften Stellen aufhängen oder auslegen.

Für schwierig zugängliche Orte

Surux Paste

Entlang der von Mäusen und Ratten belauften Stellen auswerfen.