



# Gemüse Karotten

## Unkrautbekämpfung Vorauflaufbehandlungen

Nachauflauf

Gegen aufgelaufene Gräser und Quecken

## Schutz vor Krankheiten

Alternaria  
Möhrenschwärze

## Schutz vor Schädlingen

Möhrenfliege

## Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator

Qualitätssicherung mit Ca-Düngung

Nachsaat

2-6-Blatt

8-10-Blatt

3 Wochen vor Ernte

### Centium 36 CS

0,25 l/ha

Sofort nach der Saat anwenden. Nicht in Herbst- und Wintersaaten. Geeignete Mischpartner zumischen.

### Sitradol SC + Linutop

3-4 l/ha + 0,5-1 l/ha

Sofort nach der Saat bis spätestens 3 Tage danach einsetzen. Oder im Splittverfahren im frühen Nachauflauf.

Kann mit anderen Herbiziden gemischt werden.

### Linutop

1-1,5 l/ha

Im Splittverfahren einsetzen und Mengen dem Kulturstadium anpassen.

Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten mit 0,5 l/ha.

### Select + Zofal R

0,5-1 l/ha + 1-2 l/ha

Vorbeugend einsetzen, max. 3 x pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung.

### Amistar

1 l/ha

Als Folgebehandlung nach Amistar. Max. 3 x pro Saison.

### Slick oder Fezan

0,5 l/ha

1 l/ha

Kontaktfungizid mit guter Regenfestigkeit. Einsatz vor Hitzeperioden sinnvoll.

### Daconil 500

3 l/ha

Gegen Saisonschluss einsetzen oder zum Stoppen einer starken Infektion.

### Oxykupfer 50

5 kg/ha

### Novo Tak

0,1 % (1 l/ha)

Für Lagen mit starkem Befallsdruck. Sofort nach der Saat spritzen und bewässern.

Einsatz bei Flugbeginn, alle 7 Tage wiederholen. Zwischen 16-20 Uhr anwenden.

### Talstar SC

0,5 l/ha

In Mischung mit den ersten Fungizidspritzungen. Sorgt für ausgeglichenes Wachstum und höhere Ausbeuten.

### Goëmar Start

2 l/ha

Hemmt Wachstumsrisse bei hoher Wasserversorgung.

### Calshine

2 l/ha

**NEU**

**NEU**