



# Gemüse A–Z

## Buschbohnen

### Krankheiten

Botrytis, Sclerotinia,  
Falscher Mehltau

**Amistar** (14)  
0,1 % (1 l/ha)

Max. 1–2 Behandlungen pro Saison.

**Frupica SC** (14)  
0,1 % (1 l/ha)

Nicht gegen Mehltau.

## Fenchel

### Unkrautregulierung

Einjährige Unkräuter  
und Gräser

**Sitradol SC**  
2–4 l/ha

**Gesäter Fenchel:** Sofort bis 5 Tage nach der Saat auf feinen, mässig feuchten Boden.  
**Gepflanzter Fenchel:** Kurz vor dem Pflanzen. Auf leichten Böden 20 ml/a nicht überschreiten; auf Moorböden 40 ml/a einsetzen.

### Krankheiten

Falscher Mehltau,  
Cercospora, Ramularia

**Amistar** ①  
1 l/ha

Ab Befallsbeginn max. 3 Behandlungen.  
Wartefrist: 1 Woche.

## Gurken, Cornichons

### Krankheiten

Eckige Blattflecken, Falscher Mehltau

**Oxykupfer 50**  
0,2 % (2 kg/ha) oder

Vorsicht! Verbrennungsgefahr.

**Cupro FL**  
0,5 % (5 l/ha)

Bei Befallsgefahr alle 2–3 Wochen behandeln.  
Max. 3 Spritzungen. Wartefrist: 3 Tage.

Echter und Falscher Mehltau

**Amistar** ①  
0,1 % (1 l/ha) oder

**Stroby WG**  
0,03 % (0,3 kg/ha)

### Schädlinge

Blattläuse, Thrips, Weisse Fliege

**Talstar SC** (14)  
0,03 % (3 dl/ha)

Behandlung beim Auftreten durchführen.

## Karotten

### Unkrautregulierung

#### Im Voraufbau

Einjährige Unkräuter  
und Gräser

**Sitradol SC + Linutop**  
3–4 l/ha + 0,4–1 l/ha

Sofort nach der Saat bis 3 Tage danach, vor dem Auflaufen der Kultur.

#### Im frühen Nachaufbau

Einjährige Gräser und  
Samenunkräuter

**Sitradol SC** 1,5 l/ha  
**+ Linutop** 0,5 l/ha  
**+ Zofal R** 1 l/ha  
oder

Ab Keimblatt der Karotten einsetzen.  
2–3 Behandlungen im Abstand von 7 Tagen.

**Linutop** 1,5 l/ha  
**+ Select** 0,5 l/ha  
**+ Zofal R** 0,5 l/ha

Nach 10 Tagen wiederholen.

## Karotten Fortsetzung

Gegen Gräser inklusive Hirsen

Auf aufgelaufene Unkräuter

### Krankheiten

Alternaria – Möhrenschwärze

### Schädlinge

Möhrenfliege, Möhrenblattsauger

Möhrenfliege, Blattläuse

### Düngung

Blattdüngung

## Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

## Reglone

3–4 l/ha

## Daconil 500

3 l/ha oder

## Amistar<sup>®</sup>

0,1 % (1 l/ha)

## Novo Tak (14)

0,1 % (1 l/ha)

## Talstar SC (28)

0,5 l/ha

## Flüssigdünger S

0,4% (4 l/ha)

Behandlung auf aufgelaufene Gräser.

Vor dem Auflaufen der Karotten einsetzen.

Ab dem 5–6-Blatt-Stadium der Karotten regelmässig behandeln.

Ab Befallsbeginn in Abständen von 2 Wochen. Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 3 Behandlungen pro Saison.

0,5 l pro Laufmeter giessen, wenn Karotten 5–10 cm hoch sind. Beim Auftreten behandeln.

Während des Fluges alle 10–14 Tage. Gegen Blattläuse beim Auftreten behandeln. Gegen Möhrenfliege 1000 l Wasser/ha gemäss Warndienst.

Mischbar mit Fungiziden und Insektiziden.

## Kohlgewächse

### Unkrautregulierung

#### Vor dem Pflanzen

Einjährige Unkräuter und Gräser

#### Nach dem Pflanzen

Einjährige Unkräuter und Gräser

Gegen Gräser

### Schädlinge

Kohlfliege, Erdflöhe und andere Schädlinge

Kohlgallenrüssler, Weisse Fliege, Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge, Gefleckter Kohltriebbrüssler

Kohleulen, Kohlweissling, Kohlmotte

Kohleulen, Erdflöhe, Kohlrübsenblattwespe

Kohleulen, Kohlweisslinge

### Düngung

Blattdüngung

## Sitradol SC

4–5 l/ha

## Devrinol Plus

4 l/ha

## Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

## Novo Tak (21)

0,1 % (1 l/ha)

## Talstar SC (14)

0,03 % (0,3 l/ha)

## Steward (14)

0,085 % (85 g/ha)

## Pyrinex (14)

0,3 % (3 l/ha)

## Nomolt (14)

0,03 % (0,3 l/ha)

## Flüssigdünger S

0,4% (4 l/ha)

Auf leichte und mittelschwere Böden 40 ml/a, auf schwere und humose Böden 50 ml/a.

Nach dem Pflanzen spritzen und leicht einregnen.

Gegen aufgelaufene Gräser.

Nach dem Setzen mit 1 dl Brühe pro Pflanze giessen.

Bei Befallsbeginn behandeln.

Behandlung nach 2 Wochen wiederholen!

Beim Auftreten behandeln.

Beim Auftreten spritzen, gut benetzen und wenn notwendig nach ca. 2 Wochen wiederholen.

Verbessert zusätzlich Haftfähigkeit der Fungizide und Insektizide.