

	Längswachstum	Schliessen des Bestandes	Blüte	Verholzen der Stängel	Abreife
<b>Schutz vor Schädlingen</b>					
Gegen Schnecken während Vegetation		<b>Metarex TDS</b> 5 kg /ha	<b>Mollux FL</b> 4 l/ha		Evtl. Behandlungen mehrmals wiederholen.
<b>Ernährungsoptimierung</b>					
Pflanzenaktivator		<b>Goëmar Start</b> 3×2,5 l/ha	Behandlung in Kombination mit den ersten Fungizidbehandlungen. Für einen besseren Knollenansatz und optimale Ausnutzung der Nährstoffe. In Moorböden Goëmar Opti einsetzen.		
Ergänzungsdüngung			<b>Flüssigdünger S</b> 4 l/ha je Behandlung	Mischbar mit den Fungiziden und Insektiziden. Bei Trockenheitsstress zuwarten mit Einsatz.	
			<b>Calshine</b> 2 l/ha	Für eine gleichmässige Ca-Versorgung. Hemmt Wachstumsrisse.	
<b>Krautvernichtung</b>					
Saatkartoffeln			<b>Reglone</b> 2×2,5 l/ha	Beste Resultate mit vorgängigem Abschlegeln des Krautes. Mind. 500 l/ha Spritzbrühe einsetzen. Mischbar mit Signal 0,5 l/ha.	
Speise- und Industriekartoffeln		Vorgängiges Abschlegeln beschleunigt Wirkung. Mind. 500 l/ha Spritzbrühe verwenden. Mischbar mit Signal 0,5 l/ha.		<b>Reglone</b> 5 l/ha oder im Split 2×2,5 l/ha	
<b>Gegen Schnecken nach Krautvernichtung</b>		Vor oder sofort nach Krautvernichtung Knollen schützen. Schutz bis zur Ernte aufrechterhalten.			<b>Metarex TDS</b> 5 kg/ha
<b>Wichtige Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reglone auf taunasse Pflanzen einsetzen.</li> <li>● Hohe Lichtintensität begünstigt Wirkung.</li> <li>● Bei starken Stauden im Abstand von 5 Tagen behandeln.</li> </ul>				