

Randen

Unkrautregulierung

Im Nachauflauf

Einjährige Unkräuter
und Gräser

Krankheiten

Cercospora- und Ramularia-
Blattfleckenkrankheit

Bettix SC + Beetup Pro SC

1,5 l/ha + 1 l/ha

Beetup Pro SC + Chloridazon DF

1,5–2 l/ha + 1 kg/ha

Oxykupfer 50 (21)

0,5–0,7 % (5–7 kg/ha)

Amistar Xtra (35)

1 l/ha

Slick (14)

0,05 % (0,5 l/ha)

Im Splitverfahren auf aufgelaufene Unkräuter.
2–3 Behandlungen. Bettix SC kann durch
300 g/ha Venzar ersetzt werden.

Im 2-Blatt-Stadium der Unkräuter. Splitbehand-
lung gemäss Gebrauchsanweisung.

Beim Auftreten der ersten Flecken, im Abstand
von ca. 3 Wochen 1- bis 2-mal wiederholen.

Vorbeugend einsetzen.

Rettiche, Radieschen, Schwarz- wurzeln

Unkrautregulierung

Im Vorauflauf

Einjährige Unkräuter und Gräser

Krankheiten

Alternaria, Falscher Mehltau,
Weisser Rost

Schädlinge

Erdflöhe, Blattläuse

Kohlfliege

Sitradol SC

2–2,5 l/ha

Amistar (21)

1 l/ha

Talstar SC (14)

0,03 % (0,3 l/ha) oder

Novo Tak (14)

0,1 % (1 l/ha)

Novo Tak (14)

0,1 % (1 l/ha)

In Schwarzwurzeln: Bis 5 Tage nach der Saat
einsetzen.

Vorbeugend einsetzen.
Max. 2 Behandlungen pro Saison.

Kurz nach dem Auflaufen behandeln.

Kurz nach dem Auflaufen behandeln.

3–4 l Brühe pro m² nach dem Auflaufen der
Rettiche giessen.

Salat (Kopfsalat, Endivien, Chicorée, Lattich)

Krankheiten

Falscher Mehltau, Schwarzfäule
und Botrytis (Teilwirkung)

Falscher Mehltau

Amistar[®] (21)

0,1 % (1 l/ha)

Valbon (21)

1,7 kg/ha

Alial 80 WG (21)

2 kg/ha

Ab dem Setzen bei Befallsgefahr alle
8–10 Tage, max. 3 Behandlungen pro Saison.
Wartefrist: 3 Wochen.

Vorbeugend einsetzen.

Systemische Wirkung.

NEU

Blattfleckenkrankheit	Slick (21) 0,05 % (0,5 l/ha)	Sofort nach der Pflanzung oder bei Befallsbeginn.
Schädlinge Blattläuse	Gazelle SG (14) 150 g/ha	Beim Auftreten behandeln.
Salat (Nüsslialat) Unkrautregulierung Im Nachauflauf Auf aufgelaufene Unkräuter nach der Saat	Reglone 3 l/ha	Vor dem Auflaufen des Salates.
Krankheiten Echter Mehltau	Armicarb (3) 0,5 % (5 kg/ha)	Vorbeugend einsetzen.
Schädlinge Blattläuse	Slick (21) 0,05 % (0,5 l/ha)	Sofort nach der Pflanzung oder bei Befallsbeginn.
	Talstar SC (14) 0,03 % (0,3 l/ha)	Beim Auftreten behandeln. Kann durch Novo Tak (0,1 %) ersetzt werden.
Sellerie Unkrautregulierung Im Vorauflauf Einjährige Unkräuter und Gräser	Sitradol SC + Linutop 2–3 l/ha + 0,4–1 l/ha	Vor oder unmittelbar nach dem Pflanzen behandeln.
Krankheiten Septoria an Sellerieblättern	Amistar (14) 0,1 % (1 l/ha)	Nach dem Pflanzen, dann alle 3–4 Wochen wiederholen.
Schädlinge Möhrenfliege (angiessen)	Slick (14) 0,05 % (0,5 l/ha)	
	Daconil 500 (21) 0,3 % (3 l/ha)	
	Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)	1–2 dl Brühe pro Pflanze nach dem Anwachsen.
Möhrenfliege	Talstar SC (28) 0,05 % (0,5 l/ha)	Während des Fluges alle 10–14 Tage behandeln. Gemäss Warndienst.
Spargeln Unkrautregulierung Ein- und mehrjährige Unkräuter und Gräser	Aprex 4–6 kg/ha	Vor dem Durchstossen der Spargeln oder nach der Ernte. Erst ab 4. Standjahr. Um die Wirkung zu beschleunigen, kann vor dem Durchstossen 3 l/ha Roundup Max beigemischt werden.
Krankheiten Blattschwärze	Daconil 500 0,3 % (3 l/ha)	Vorbeugend und mit genügend Wasser alle 10–14 Tage einsetzen.