

## Lauch

### Unkrautregulierung

#### Im Voraufbau

Gegen einjährige Unkräuter

Einjährige Unkräuter und  
Gräser in Setzlingen

#### Im Nachaufbau

Gegen alle Gräser

### Krankheiten

Alternaria, Lauchrost, Falscher  
Mehltau, Papierflecken,  
Purpurflecken

### Schädlinge

Lauchmotte, Thrips

Thrips

Thrips

## Linutop

1,5 l/ha

## Sitradol SC + Linutop

4 l/ha + 0,4–1 l/ha

## Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

## Amistar (14)

0,1 % (1 l/ha)

## Slick (14)

0,05 % (0,5 l/ha)

## Talstar SC (14)

0,03 % (3 dl/ha)

## Gazelle SG (14)

0,05 % (500 g/ha)

## Pyrinex (14)

0,3 % (3 l/ha)

Sofort bis 15 Tage nach der Pflanzung behandeln.

Kurz vor oder bis 5 Tage nach dem Pflanzen  
behandeln.

Behandlung, wenn Gräser aufgelaufen sind.

Ab Befallsgefahr in Abständen von 14 Tagen.  
Max. 3 Behandlungen pro Saison.

Max. 4 Behandlungen pro Saison.

Beim Auftreten von Juli bis September.

Max. 2 Behandlungen im Abstand von  
8–10 Tagen.

## Melonen, Zucchini

### Krankheiten

Echter und Falscher Mehltau

Echter Mehltau, Alternaria

Echter Mehltau

### Schädlinge

Blattläuse

## Amistar (3)

0,1 % (1 l/ha) oder

## Stroby WG (14)

0,03 % (0,3 kg/ha)

## Slick (21)

0,05 % (0,5 l/ha)

## Armicarb (3)

0,5 % (5 kg/ha)

## Gazelle SG (3)

0,0125 % (125 g/ha)

Nach Erscheinen der ersten Symptome alle  
2–3 Wochen. Maximal 3 Behandlungen pro  
Saison. Wartezeit: 3 Tage.

Bei Befallsbeginn sofort einsetzen.  
Nur Zucchini.

Nur vorbeugende Wirkung.

Systemische Wirkung.