

<p>Blattfleckenkrankheit</p> <p>Schädlinge</p> <p>Blattläuse</p>	<p>Slick (21) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Gazelle SG (14) 150 g/ha</p>	<p>Sofort nach der Pflanzung oder bei Befallsbeginn.</p> <p>Beim Auftreten behandeln.</p>
<p>Salat (Nüsslisalat)</p> <p>Unkrautregulierung</p> <p>Im Nachauflauf Auf aufgelaufene Unkräuter nach der Saat</p> <p>Krankheiten</p> <p>Echter Mehltau</p> <p>Schädlinge</p> <p>Blattläuse</p>	<p>Reglone 3 l/ha</p> <p>Armicarb (3) 0,5 % (5 kg/ha)</p> <p>Slick (21) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Talstar SC (14) 0,03 % (0,3 l/ha)</p>	<p>Vor dem Auflaufen des Salates.</p> <p>Vorbeugend einsetzen.</p> <p>Sofort nach der Pflanzung oder bei Befallsbeginn.</p> <p>Beim Auftreten behandeln. Kann durch Novo Tak (0,1 %) ersetzt werden.</p>
<p>Sellerie</p> <p>Unkrautregulierung</p> <p>Im Vorauflauf Einjährige Unkräuter und Gräser</p> <p>Krankheiten</p> <p>Septoria an Sellerieblättern</p> <p>Schädlinge</p> <p>Möhrenfliege (angiessen)</p> <p>Möhrenfliege</p>	<p>Sitradol SC + Linutop 2–3 l/ha + 0,4–1 l/ha</p> <p>Amistar (14) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Slick (14) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Daconil 500 (21) 0,3 % (3 l/ha)</p> <p>Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Talstar SC (28) 0,05 % (0,5 l/ha)</p>	<p>Vor oder unmittelbar nach dem Pflanzen behandeln.</p> <p>Nach dem Pflanzen, dann alle 3–4 Wochen wiederholen.</p> <p>1–2 dl Brühe pro Pflanze nach dem Anwachsen.</p> <p>Während des Fluges alle 10–14 Tage behandeln. Gemäss Warndienst.</p>
<p>Spargeln</p> <p>Unkrautregulierung</p> <p>Ein- und mehrjährige Unkräuter und Gräser</p> <p>Krankheiten</p> <p>Blattschwärze</p>	<p>Aprex 4–6 kg/ha</p> <p>Daconil 500 0,3 % (3 l/ha)</p>	<p>Vor dem Durchstossen der Spargeln oder nach der Ernte. Erst ab 4. Standjahr. Um die Wirkung zu beschleunigen, kann vor dem Durchstossen 3 l/ha Roundup Max beigemischt werden.</p> <p>Vorbeugend und mit genügend Wasser alle 10–14 Tage einsetzen.</p>