



Weinbau

Schutz vor Krankheiten

Gegen Schwarzflecken,
Rotbrenner, Falschen Mehltau

Daconil 500
0,3 % (2,4 l/ha)

Auf gute Benetzung achten.

Gegen Falschen Mehltau

Amarel Folpet DF
0,15 % (1,5–2,4 kg/ha)

Gegen Falschen und Echten
Mehltau mit Teilwirkung
gegen Botrytis

Quadris Max
0,2 % (1,6–3,2 l/ha)

Gegen Falschen Mehltau

Fantic F
0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)

Gegen Falschen Mehltau

Transsystemisches Fungizid.
Beste Geizenwirkung.

Vincare
0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)



Gegen Echten Mehltau

Sufralo oder
0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

Talendo
0,025 % (0,2–0,4 l/ha)

oder **Cyflamid**
0,03 % (0,24–0,48 l/ha)

Alle Produkte gut mischbar mit unseren Produkten gegen Falschen Mehltau.

Austrieb Triebe 5 cm Vorblüte Blüte Nachblüte Traubenschluss

Gegen Falschen und Echten Mehltau sowie Rotbrenner

Olymp Duplo DF
0,15 % (1,5–2,4 kg/ha)

Gegen Falschen Mehltau mit Nebenwirkung gegen Botrytis

Amarel Kupfer DF
0,25 % (4 kg/ha)

Gegen Falschen und Echten Mehltau mit Nebenwirkung gegen Botrytis

Olymp Cupro
0,2 % (2,4–3,2 kg/ha)

Kann den anderen Fungiziden zugesetzt werden.

Cupro FL 0,15% (1,2–2,4 l/ha) **oder** **Oxykupfer 50** 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha) **oder** **Kocide 2000** 0,125–0,4 % (1,5–6 kg/ha)

NEU

Gegen Botrytis

Mischbar mit Fungiziden. Vor Traubenschluss einsetzen.

Cercobin
0,17 % (2 l/ha)

Folgebehandlung bei Farbumschlag nach Cercobin.

Frupica SC
0,1 % (1,2 l/ha)

Netzmittel für Fungizide

Sticker
0,1 l/100 l Wasser

Wichtige Hinweise

- Massgebend für eine gute Wirkung sind Präparatmenge je Fläche und eine einwandfreie Applikationstechnik.
- Die aufgeführten Konzentrationen stützen sich auf Berechnungen von Agroscope Changins Wädenswil.
- Olymp Duplo, Quadris Max, Fantic F, Vincare, Talendo max. 3 Behandlungen je Saison. Cyflamid 2 Behandlungen.