



Weinbau

Unkrautbekämpfung

Komplettlösung
inkl. Winden

**Chikara 25 WG + Exell
+ Roundup Max**
150–200 g/ha + 0,5 l/ha + 2,5 l/ha

Dosierungen gelten für behandelte Fläche. Wirkt über Boden und Blätter. Behandlung ab Anfang April bis Mitte Mai. Gegen Schachtelhalm 200 g/ha Chikara ab Ende Juli einsetzen. Erst ab 4. Standjahr einsetzen. Vorsicht bei Neu- und Nachpflanzungen!

Bodenherbizid
lange Dauerwirkung

**Chikara 25 WG
+ Linutop + Exell**
200 g/ha + 3 l/ha + 0,5 l/ha

Ab dem 4. Standjahr einsetzen.

Fertigmischung

Alce
6 l/ha

Abdrift vermeiden. Nur ab 4. Standjahr einsetzen. Speziell wirksam gegen Amaranten und Schwarzen Nachtschatten. Bei grossen Unkräutern Roundup Max zusetzen.

Gegen aufgelaufene Gräser

Select + Zofal R
0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Gegen Quecken 1 l/ha.

Totalherbizid

Roundup Max
4–7,5 l/ha

Schutz vor Schädlingen

Gegen Kräusel- und Pockenmilben, Rebzikade, Reblaus, Springwurm, Schildläuse

Oleo Diazinon R
0,5 % (4–5 l/ha)

Bei Temperaturen über 12 °C einsetzen.
Auf eine gute Benetzung achten.

	Austrieb	Triebe 5 cm	Vorblüte	Blüte	Nachblüte
Gegen Springwurm, Grüne Rebzikade, Erdraupen, Rhombenspanner	Steward 0,0125 % (125 g/ha)				
Gegen Eier der Spinnmilbe	Trévi 0,05 % (0,75 kg/ha)				
Gegen einbindigen und bekreuzten Traubenwickler 1. und 2. Generation		Bei lang anhaltendem Flug wiederholen.		Steward 0,0125 % (150 g/ha) oder Pyrinex 0,15 % (1,8–3 l/ha)	
Ernährungsoptimierung					
Pflanzenaktivator	Erhöht die Widerstandskraft der Pflanzen.	Goëmar Start 3×2 l/ha			3 Behandlungen bis Ende Blüte.
Ergänzungsdüngung		Flüssigdünger S 4 l/ha je Behandlung			
Gegen Stiehlähme		Erste Behandlung bei einem Zuckergehalt von 30° Öchsle.		Calshine 3 l/ha	