



Gemüse Zwiebeln

Unkrautbekämpfung

Vorsaatbehandlung

Roundup Max
4 l/ha

Bei genügend Sonnenschein 1 Tag vor Zwiebelsaat gegen Problemunkräuter.

Vorauflaufbehandlung

Sitradol SC
1–2 l/ha

Sofort nach der Saat evtl. in Mischung mit Ramrod. Auf leichten Böden max. 1 l/ha. Bei Steckzwiebeln Linutop 1 l/ha zusetzen.

Nachauflauf

Sitradol SC
0,5–1,5 l/ha

Im Splittverfahren ab Peitschenstadium allein oder in Mischung mit Topper, Aufwandmengen der Kulturgröße anpassen.

Gegen Rispengras und andere

Select + Zofal R
0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten mit 0,5 l/ha.

Schutz vor Krankheiten

Falscher Mehltau und Pflanzenstimulation

Amistar
1 l/ha

Vorbeugend zu Beginn der Saison einsetzen, max. 3 × pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung.

Kontaktfungizid gegen Falschen Mehltau

Kontaktfungizide mit guter Regenfestigkeit.

Daconil 500
3 l/ha

oder

Zignal
0,5 l/ha

NEU

Während dem Hauptwachstum einsetzen. Nicht mit EC-haltigen Produkten mischen. Max. 3 × pro Saison.

Fandango
1,25 l/ha

Mit transsystemischer Wirkung. Für Stoppspritzungen in Mischung mit Fandango 1,25 l/ha. Max. 3 × pro Saison.

Valbon
1,6 kg/ha

Samtfleckenkrankheit
Purpurflecken

Slick
0,5 l/ha

Bei Befallsbeginn einsetzen. Max. 4 × pro Saison.

Blattbotrytis
Zwiebelhalsfäule

1 Behandlung Anfang Juli, später mit anderen Produkten Schutz weiterführen.

Frupica SC
1 l/ha

Saat

Peitsche

2–8-Blatt

Bulbenbildung
21. Juni

Abreife

Ernte