



Pommiers/ Poiriers

Divers

Adjuvant avec fongicides et insecticides

Contre la rugosité de la pomme Golden Delicious

Contre taches amères, conservation (pommes, poires)

Activateur des plantes (pommes, poires)

Eclaircissage, chute prématurée (pommes)

Contre la chute prématurée (pommes)



Débourrement		C		D	E	Floraison	Mai	Juin	Juillet	Août	
A	B										
Sticker 0,1 l/100 l d'eau (max. 0,5 l/ha)											
		Première application fin floraison. 3 applications à intervalles de 10 jours. Au max. 30 jours après la floraison.				Pro Gibb 47 0,4–0,8 l/ha					
		Selon les variétés et charge 2–6 applications à intervalles de 14 jours, jusqu'à 2 semaines avant la récolte. Délai d'attente 14 jours.				Calshine 2,4 l/ha					
						Goëmar Start 3 × 2 l/ha		1 ^{ère} application bouton rouge, 2 ^{ème} préfloral, 3 ^{ème} floraison, 4 ^{ème} postfloral.			
		Lorsque ¾ des pétales sont tombés. Pour renforcer l'efficacité, ajouter 0,5 dl Ajoutol à 100 l d'eau. Climat idéal 12–15 °C, haute humidité de l'air, sans vent. Ne pas appliquer sur Gala et Braeburn!				Dirigeol N 200–400 g/ha					
						Sur les variétés sujettes 5 semaines, 3 semaines et 10 jours avant la récolte. Délai d'attente 10 jours.				Dirigeol N 200 g/ha	

	Débourrement	A	B	C	D	E	Floraison	Mai	Juin	Juillet	Août
Fumure foliaire (pommes, poires)							Engrais liquide S 6 l/ha			1 ^{ère} application préfloral, 2 ^{ème} floraison, 3 ^{ème} postfloral.	
Lutte contre les taupes (pommes, poires)	Arvicolon 6 kg/ha Pour lutter contre les taupes et les campagnols toute l'année. Env. 10 appâts par ouverture.										
Régulateur de croissance Eclaircissage	Utilisation de Dirigeol N										
	Variétés de pommes							Forme de poudre			
								g/100 l		g/ha	
	Jerseymac, Vistabella, Delcorf, Fiesta, Discovery (la majorité des variétés précoces)							10		200	
	Cox Orange, Kidds Orange, Jonathan, Granny Smith							10		200	
	Primerouge, Boskoop, Glockenapfel, Goldparmäne, Idared							15		300	
	Rubinette, Jonagold, Gravensteiner, Pinova, Ariwa, Galmac, Mairac							15		300	
	Arlet, Summerred, Maigold, Spartan							20		400	
	Golden, Elstar, Iduna, Topaz							20		400	
Remarques importantes	<ul style="list-style-type: none"> ● Eclaircissage: L'application se fait vers la fin de la floraison jusqu'au plus tard 1–2 jours après (diamètre des fruits maximum 5 mm). A appliquer seul à raison de 1000 l d'eau/ha. Suivre absolument le mode d'emploi! Additionner 0,05 % d'Ajoutol ou 0,025 % d'Exell pour renforcer l'efficacité. 										