



Pommiers/ Poiriers

Contre les maladies

Contre la tavelure
(pommés, poires)

Contre la tavelure et l'oïdium
(pommés, poires)



Débourrement	Floraison	Postfloraison	Récolte
<p>Oxycuivre 2 kg/ha Cupro FL 4 l/ha Kocide 2000 4 kg/ha</p> <p>Traitement au débourrement max. 1,5 kg/ha cuivre métal par année.</p> <p>NOUVEAU</p>			
<p>Frupica SC + Captan S WG ou Delan WG 0,32 l/ha 1,6 kg/ha 0,5 kg/ha</p> <p>2–3 jours action stoppante après infection, 6–8 jours action préventive. Max. 3 applications/an.</p>		<p>Captan S WG 2,4 kg/ha</p> <p>Préventivement tous les 10–15 jours. Délai d'attente 3 semaines.</p>	
<p>Delan WG 0,8 kg/ha</p> <p>Préventif tous les 6–8 jours. A traiter jusqu'à fin juin.</p>		<p>Folpet 80 WG 1,6–2 kg/ha</p> <p>Préventivement tous les 10–15 jours. Délai d'attente 3 semaines. Ne pas traiter les poires.</p>	
<p>3–4 jours action stoppante après infection / 6–8 jours action préventive. Max. 4 applications/an, au plus tard jusqu'à fin juillet.</p>		<p>Slick ou Duotop ou Nustar 20 DF 0,24 l/ha 500 g/ha 200 g/ha</p> <p>+ Captan S WG ou Delan WG 1,6 kg/ha 0,5 kg/ha</p>	
		<p>Stroby WG + Captan S WG ou Delan WG 200 g/ha + 1,6 kg/ha ou 0,5 kg/ha</p> <p>2–3 jours action stoppante après infection. Max. 4 applications/an, au plus tard jusqu'à fin juillet.</p>	
		<p>Armcarb + Soufralo 4,8 kg/ha + 3,2 kg/ha</p> <p>Stratégie bio. Bonne efficacité contre la maladie de la suie. Délai d'attente: 3 jours.</p>	



Pommiers/ Poiriers

Divers

Adjuvant avec fongicides et insecticides

Contre la rugosité de la pomme Golden Delicious

Contre taches amères, conservation (pommes, poires)

Activateur des plantes (pommes, poires)

Eclaircissage, chute prématurée (pommes)

Contre la chute prématurée (pommes)



Débourrement		C		D	E	Floraison	Mai	Juin	Juillet	Août
A	B									
Sticker 0,1 l/100 l d'eau (max. 0,5 l/ha)										
		Première application fin floraison. 3 applications à intervalles de 10 jours. Au max. 30 jours après la floraison.				Pro Gibb 47 0,4–0,8 l/ha				
		Selon les variétés et charge 2–6 applications à intervalles de 14 jours, jusqu'à 2 semaines avant la récolte. Délai d'attente 14 jours.				Calshine 2,4 l/ha				
					Goëmar Start 3 × 2 l/ha		1 ^{ère} application bouton rouge, 2 ^{ème} préfloral, 3 ^{ème} floraison, 4 ^{ème} postfloral.			
Lorsque ¾ des pétales sont tombés. Pour renforcer l'efficacité, ajouter 0,5 dl Ajoutol à 100 l d'eau. Climat idéal 12–15 °C, haute humidité de l'air, sans vent. Ne pas appliquer sur Gala et Braeburn!						Dirigeol N 200–400 g/ha				
						Sur les variétés sujettes 5 semaines, 3 semaines et 10 jours avant la récolte. Délai d'attente 10 jours.			Dirigeol N 200 g/ha	