



Légumes haricots

Désherbage

Traitement prélevée

Contre les graminées levées et les chiendents

Maladies

Graisse du haricot

Botrytis, pourriture du collet et de la tige

Botrytis, pourriture du collet et de la tige, mildiou, anthracnose

Ravageurs

Mouche des semis

Pour une nutrition optimale

Stimule la croissance et favorise la nutrition

Postsemis

2-4 feuilles

6 feuilles

Préfloraison

Floraison

Centium 36 CS + Successor 600

0,25 l/ha + 2 l/ha

Immédiatement après le semis jusqu'à 3 jours après.

Très bonne efficacité contre les pâturins aussi avec 0,5 l/ha.

Select + Zofal R

0,5-1 l/ha 1-2 l/ha

Efficacité partielle.

Oxycuivre ou Kocide 2000

0,2 % (2 kg/ha) ou 0,2 % (2 kg/ha)

NOUVEAU

Traiter avant la floraison. Max. 2 traitements par saison.

Frupica SC

0,1 % (1 l/ha)

ou

Fezan

1 l/ha

NOUVEAU

Application préventive, max. 3 applications/an.

Amistar

0,1 % (1 l/ha)

Novo Tak

0,1 % (1 l/ha)

Traiter après le semis et arroser.

Favorise une floraison régulière.

Goëmar Start

2 l/ha