



Pois

Désherbage

Traitement post-semis

Centium 36 CS 0,2–0,25 l/ha
+ Successor 600 2 l/ha

Pois protéagineux: Application au max. 3 jours après le semis. Ne pas traiter sur sols sablonneux et filtrants. Les semences doivent être complètement recouvertes de terre. Un sol humide favorise l'efficacité.

Postlevée

Sitradol SC + Basagran SG
 2 l/ha + 0,8 kg/ha

Dès la levée jusqu'au stade 2 feuilles des adventices.
 A appliquer sur feuilles sèches.

Contre chénopodes

Trifoline
 4 l/ha

Traitement de correction contre adventices sensibles aux hormones.
 Efficace seulement sur petites adventices.

Contre les graminées levées

Select + Zofal R
 0,5 l/ha 1 l/ha

Contre les maladies

Contre le botrytis, taches sur feuilles et en partie sur oïdium

Observer les variétés sujettes et les premiers signes. Miscible avec les aphicides.

Amistar
 1 l/ha

Contre les ravageurs

Contre les limaces

Métarex TDS
 5 kg/ha

Selon le temps et la population de limaces, répéter les applications.

Contre les sitones du pois

Talstar SC
 0,1 l/ha

Pour une nutrition optimale

Activateur de croissance

Goëmar Multi
 3 l/ha

Stimule la nutrition et favorise la croissance au moment de la floraison.

Fumure foliaire d'appoint

Engrais liquide S
 4 l/ha

A appliquer lors de symptômes de carence.

Postsemis

2–4 feuilles

6 feuilles

Préfloraison

Floraison