



Framboisiers, mûriers, groseilliers à grappes, cassis

Désherbage

Adventices levées dans toutes les cultures de petits fruits

Dans les myrtilles

Dicots et graminées au printemps avant la levée (dès la 3^{ème} année)

Reglone

3–5 l/ha

Chikara + Exell

150–200 g/ha + 0,5 l/ha

Traiter en automne ou au printemps avant le départ en végétation.

Rajouter 2,5 l/ha Roundup Max contre les mauvaises herbes levées.

Maladies

Didymella (dessèchement des rameaux) sur framboisiers et oïdium, bonne action partielle contre le botrytis

Contre oïdium et rouille des framboisiers

Anthraxose due à Colletotrichum, bonne action partielle contre le botrytis, oïdium

Contre la chute prématurée des feuilles sur groseilliers

Contre le botrytis (pourriture grise) sur tous les petits fruits

Amistar

0,1 % (1 l/ha)

Slick

0,05 % (0,5 l/ha)

Amistar

0,1 % (1 l/ha) ou

Stroby WG

0,03 % (300 g/ha)

Oxycuivre 50 ou Cupro FL

0,1–0,3 % (1–3 kg/ha) ou

Kocide 2000

0,25–0,6 % (2,5–3 kg/ha)

Frupica SC

1 l/ha

1^{ère} fois sur pousses de 20–30 cm, 2^{ème} fois sur pousses de 60–70 cm et la 3^{ème} fois sur plantes de 1–1,2 m, puis 1 à 2 fois après la cueillette. Maximum 3 traitements par saison.

Dès la véraison tous les 10–14 jours. Maximum 3 traitements par saison. Délai d'attente: 3 semaines.

1 fois après la floraison et 1–2 fois après la récolte. Délai d'attente: 3 semaines.

NOUVEAU

2 traitements durant la floraison à intervalles de 10–15 jours. Délai d'attente: 2 semaines.

Ravageurs

Ravageurs hivernants

Eriophyides des ronces

Vers des framboises, thrips

Pucerons, tenthrède et autres ravageurs en cours de saison

Araignées rouges

Oléo Diazinon R

0,5 % (5 l/ha)

Soufralo

2 % (8 kg/ha)

Talstar SC

0,025 % (0,25 l/ha) ou

Pyrinex

0,15 % (1,5 l/ha)

Novo Tak

0,1 % (1 l/ha)

Trévi

0,05 % (500 g/ha)

A traiter en association avec Oxycuivre 50 ou Cupro FL.

Traiter au débourrement.

Traiter immédiatement à l'apparition du ravageur.

Traiter immédiatement à l'apparition du ravageur.

Une application avant la floraison ou après la récolte.

Croissance

Engrais foliaire et racinaire pour tous les petits fruits

Engrais liq. S

0,2 % (4 l/ha)

En présence de jaunissement toutes les semaines, sinon à associer aux fongicides.