



Légumes carottes

Désherbage

Traitements prélevées

Postlevée

Contre les graminées levées et les chiendents

Maladies

Alternariose de la carotte

Ravageurs

Mouche de la carotte

Pour une nutrition optimale

Stimule la nutrition, favorise la croissance

Pour une nutrition suffisante en Ca

Postsemis

2-6 feuilles

8-10 feuilles

3 semaines avant la récolte

Centium 36 CS

0,25 l/ha

Appliquer immédiatement après le semis, en mélange avec un partenaire. Ne pas appliquer sur les semis d'automne et de printemps.

NOUVEAU

Sitradol SC + Linutop

3-4 l/ha + 0,5-1 l/ha

Traiter immédiatement après le semis, ou au plus tard 3 jours après, ou appliquer des traitements fractionnés en postlevée.

Peut être mélangé à d'autres herbicides.

Linutop

1-1,5 l/ha

Appliquer en traitement split et adapter les quantités selon le stade de la culture.

Très bonne efficacité contre les pâturins avec 0,5 l/ha.

Select + Zofal R

0,5-1 l/ha + 1-2 l/ha

Application préventive, max. 3 × par saison. Action stimulante de la plante.

Amistar

1 l/ha

En traitement de suite après Amistar. Max. 3 × par saison.

Slick ou Fezan

0,5 l/ha

1 l/ha

NOUVEAU

Fongicide de contact, bonne résistance au lessivage. A appliquer avant une période de grande chaleur.

Daconil 500

3 l/ha

Appliquer en fin de saison ou pour stopper une forte attaque.

Oxycuivre 50

5 kg/ha

Novo Tak

0,1 % (1 l/ha)

En cas d'une forte infection. Appliquer immédiatement après le semis et arroser.

Application au début des vols, répéter tous les 7 jours. Traiter par température fraîche.

Talstar SC

0,5 l/ha

En mélange avec les premières applications de fongicides. Pour une croissance régulière et un haut rendement.

Goëmar Start

2 l/ha

Pour éviter les fissures avant la récolte ou après une période d'arrosage.

Calshine

2 l/ha