

	Fermeture de la ligne	Fermeture entre les rangs	Floraison	Lignification de la tige	Maturité
Contre les ravageurs					
Contre les limaces pendant la croissance	Métarex TDS 5 kg /ha		Mollux FL 4 l/ha		Répétez les applications si nécessaire.
Pour une nutrition optimale					
Stimule la nutrition, favorise la croissance	Goëmar Start 3×2,5 l/ha		Appliquer en combinaison avec les premiers traitements fongicides. Pour une meilleure croissance des tubercules et une absorption optimale des éléments minéraux.		
Fumure foliaire d'appoint					
	Engrais liquide S 4 l/ha par application		Miscible avec nos fongicides et insecticides. Ne pas appliquer lors de sécheresse.		
	Calshine 2 l/ha		Pour une nutrition suffisante en Ca. Freine l'éclatement.		
Défanage					
Défanage des semenceaux			Reglone 2×2,5 l/ha		Résultat optimal avec un battage antérieur des fanes. Appliquer au moins 500 l/ha de bouillie. Miscible avec Signal 0,5 l/ha.
Pommes de terre de consommation et industrielles			Un battage antérieur augmente l'efficacité. Appliquer au moins 500 l/ha de bouillie. Miscible avec Signal 0,5 l/ha.	Reglone 5 l/ha ou en split 2×2,5 l/ha	
Contre les limaces après défanage			Avant et après le défanage, protéger les tubercules jusqu'à la récolte.	Métarex TDS 5 kg/ha	
Remarques importantes	<ul style="list-style-type: none"> ● Appliquer Reglone le matin en présence de rosée. ● Une haute luminosité augmente l'efficacité. ● Sur fanes en forte croissance, fractionner l'application à 5 jours d'intervalle. 				