



Cerises/Pruneaux

Contre les maladies

Contre la maladie criblée
(cerises, pruneaux)

NOUVEAU

Contre la maladie des
pochettes (cerises, pruneaux)

Contre la moniliose
(cerises, pruneaux)

Contre la pourriture amère

Contre l'antracnose
(cerises)

Contre le chancre bactérien
(cerises)

Contre la rouille du prunier
(pruneaux)

	Stade de débourrement										
	A	B	C	D	E	Floraison	Mai	Juin	Juillet	Août	
						Débourrement: Delan WG ou Oxycuivre. Floraison: Amistar, Slick ou Duotop. S'il n'y a pas eu lieu de traitement à la floraison: Delan WG, Captan S WG ou Folpet WG 1× avant floraison, 1× après floraison.					
	Delan WG 1,2 kg/ha		Delan WG 1,2 kg/ha		Amistar 1,6 l/ha		Delan WG 1,2 kg/ha				
	Oxycuivre 3,2 kg/ha		Captan S WG 2,4 kg/ha		Duotop 0,8 kg/ha		Captan S WG 2,4 kg/ha				
	Kocide 2000 / Cupro FL 6 kg/ha		Folpet 80 WG 1,6-2 kg/ha		Slick 0,32 l/ha		Folpet 80 WG 2,5 kg/ha				
	Oxycuivre 3,2 kg/ha		Delan WG 1,2 kg/ha		Oxycuivre au débourrement, 1-2× Delan WG au débourrement jusqu'à floraison.						
	Cupro FL 6 l/ha										
	En mélange avec Delan WG 0,5 kg/ha ou Captan S WG 1,6 kg/ha. Sur cerises 0,48 l/ha Fezan.					Duotop 0,8 kg/ha Cercobin 2 l/ha					
	1 application au stade petits pois, 1-2 applications tous les 15 jours.					Slick 0,32 l/ha ou Amistar 1,6 l/ha					
						Selon la météo: 1× début floraison, 1× floraison, 1-2× stade petits pois, 1×3 semaines avant la récolte. Amistar: Max. 3 applications/an. Duotop max. 4 applications/an.					
						Amistar 1,6 l/ha Delan WG 1,2 kg/ha					
						Traiter dès les premières taches. En cas de fortes attaques, continuer les traitements à intervalles de 15 jours.					
						Amistar 1,6 l/ha Delan WG 1,2 kg/ha Captan S WG 2,4 kg/ha Folpet 80 WG 2,5 kg/ha					
						Pour éviter les taches de traitement, ajouter un mouillant.					
						Application en automne.					
						Oxycuivre 3,2 kg/ha					
						1 ^{ère} application mi-fin juin, 2 ^{ème} mi-fin juillet.		Delan WG 1,2 kg/ha		Delan WG 1,2 kg/ha	