

	Stade de débourrement											
	A	B	C	D	E	Floraison	Mai	Juin	Juillet	Août		
Contre les ravageurs												
Teigne des fleurs (cerises)	Oleo Diazinon R 8 l/ha	Au débourrement.										
Contre la tordeuse de la pelure, la noctuelle, les cheimatobies (cerises, pruneaux)					Steward 270 g/ha		Pyrinex 2,4 l/ha		A appliquer contre les tordeuses de la pelure selon les avertissements.			
Contre les cheimatobies (cerises, pruneaux)	Oleo Diazinon R 8 l/ha	Les applications au débourrement réduisent l'infection.		Steward 270 g/ha		ou Nomolt 0,64 l/ha		Appliquer Steward ou Nomolt au stade point blanc. Appliquer Steward fin floraison.				
Contre le puceron noir du cerisier (cerises)	Oleo Diazinon R 8 l/ha								Gazelle SG 320 g/ha		Appliquer Oleo Diazinon R préventivement pour réduire l'infection au débourrement.	
Contre la mouche de la cerise (cerises, pruneaux)								Gazelle SG 320 g/ha		1 ^{er} traitement avec Roxion 0,6 l/ha. 2 ^{ème} 10 jours plus tard avec Gazelle SG.		
Contre les pucerons (pruneaux)	Préventivement au débourrement, pucerons verts du prunier avant la floraison, en été puceron cendré du prunier.			Gazelle SG 240 g/ha		Gazelle SG 240 g/ha						
Contre les acariens (cerises, pruneaux)	Trévi 0,8 kg/ha					Trévi 0,8 kg/ha					En forte présence d'œufs, traiter avec Trévi au débourrement. Selon besoin, postfloraison et/ou en été. A appliquer jusqu'au 30 juin.	
Contre l'hoplocampe (pruneaux)								Gazelle SG 240 g/ha Pyrinex 2,4 l/ha		Fin floraison.		
Contre le carpocapse des prunes (pruneaux)								Env. mi-juillet à intervalles de 15 jours.		2 x Steward 270 g/ha		