

Céleris

Désherbage

En prélevée

Graminées et dicots annuelles

Maladies

Septoriose

Ravageurs

Mouche de la carotte
(en arrosage)

Mouche de la carotte
(en saison)

Sitradol SC + Linutop

2–3 l/ha + 0,4–1 l/ha

Amistar (14)

0,1 % (1 l/ha)

Slick (14)

0,05 % (0,5 l/ha)

Daconil 500 (21)

0,3 % (3 l/ha)

Novo Tak (14)

0,1 % (1 l/ha)

Talstar SC (28)

0,05 % (0,5 l/ha)

Traiter peu avant ou immédiatement après la plantation.

Après la plantation et répéter toutes les 3–4 semaines.

1–2 dl de bouillie par plante après la reprise.

Durant le vol, traiter tous les 10–15 jours; selon avis des stations officielles.

Choux (toutes les variétés)

Désherbage

Avant plantation

Dicots et graminées annuelles

Après plantation

Dicots et graminées annuelles

Contre graminées

Maladies

Maladie des taches noires
du chou – Alternariose

Taches des feuilles, oïdium
Rouille blanche

Nervures noires du chou

Ravageurs

Pucerons

Pucerons, teigne, charançon,
gallicole, cécidomyie, mouche
blanche, noctuelle, piéride

Noctuelle du chou, piéride de
la rave, mouche blanche

Sitradol SC

4–5 l/ha

Devrinol Plus

4 l/ha ou

Centium 36 CS

0,25 l/ha

Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Slick (14)

0,05 % (0,5 l/ha)

Amistar (14)

1 l/ha

Oxycuivre 50 (7)

2 kg/ha

Roxion (21)

0,6 l/ha

Talstar SC (14)

0,03 % (0,3 l/ha)

Steward (14)

0,85 % (85 g/ha)

Sur sol léger et mi-lourd 40 ml/a, sol lourd
et humifère 50 ml/a.

Traiter après la plantation et arroser.

Traiter après la plantation.
En mélange avec un partenaire.

Traitement sur des graminées levées.

Traitement préventif du chou.
Max. 4 × par saison.

Traitement préventif.
Max. 3 × par saison.

A appliquer tôt en automne.

Traiter au début de l'attaque.

Traiter à l'apparition du ravageur.
Contre la cécidomyie pendant le vol.

NOUVEAU

Altise	Pyrinex (14) 0,3 % (3 l/ha)	Traiter à l'apparition du ravageur.
Piéride	Nomolt (14) 0,03 % (0,3 l/ha)	Traiter à l'apparition du ravageur. Bien mouiller et répéter si nécessaire.
Croissance Engrais foliaire	Engrais liq. S 0,4 % (4 l/ha)	Miscible avec nos fongicides et insecticides.
Concombres, cornichons Maladies Taches anguleuses et mildiou	Oxycuivre 50 0,2 % (2 kg/ha) ou Cupro FL (3) 0,5 % (5 l/ha) Kocide 2000 (21) 0,2 % (2 kg/ha)	Attention! Danger de brûlures.
Oïdium	Armicarb 0,5 % (5 kg/ha)	2–3 applications, dans un délai de 7 jours. Délai d'attente 3 jours.
Mildiou et oïdium	Amistar ^① (3) 0,1 % (1 l/ha) ou Stroby WG (3) 0,03 % (0,3 kg/ha)	En présence de danger d'infection toutes les 2–3 semaines. Maximum 3 fois par saison. Délai d'attente: 3 jours.
Gombose Ravageurs Pucerons, thrips et mouches blanches	Slick 0,05 % (0,5 l/ha) Talstar SC (14) 0,03 % (3 dl/ha)	Seulement pour les cultures couvertes. Traiter à l'apparition des ravageurs.
Epinards Désherbage En prélevée En mélange immédiatement après le semis	Centium 36 CS 0,15 l/ha + Venzar 600 g/ha	Ne pas traiter les épinards d'hiver.
En postlevée Adventices annuelles Ravageurs Pégomyie (mouches de la betterave)	Beetup 3×1–1,5 l/ha Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)	1 ^{ère} application au stade 2 feuilles et répéter 5–7 jours plus tard. 1 fois sur feuilles complètement développées et répéter 1–2 fois à intervalles de 15 jours.
Fenouil Désherbage Dicots et graminées annuelles	Sitradol SC 2–4 l/ha	Fenouil semé: De suite jusqu'à 5 jours après le semis sur sol fin et modérément humide. Fenouil planté: Peu avant la plantation. Sol léger 20 ml/a (à ne pas dépasser), sol tourbeux 40 ml/a.
Maladies Mildiou, Cercospora, Ramularia	Amistar ^① 1 l/ha	Selon les conditions. Au max. 3 traitements par an. Délai d'attente: 7 jours.

NOUVEAU

NOUVEAU