

<p>Ravageurs Altise</p> <p>Mouche du chou</p>	<p>Talstar SC (14) 0,03 % (0,3 l/ha) ou</p> <p>Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)</p>	<p>De suite après la levée.</p> <p>En arrosage 3–4 l de bouillie au m² après a levée des navets.</p>
<p>Salades, pommées, chicorées, endive, laitue</p> <p>Maladies Mildiou, pourritures, (botrytis, Rhizoctonia, Sclerotinia)</p> <p>Mildiou</p> <p>Taches sur feuilles</p> <p>Ravageurs Pucerons</p>	<p>Amistar ^①(21) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Valbon (21) 1,7 kg/ha</p> <p>Alial 80 WG (21) 2 kg/ha</p> <p>Slick (14) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Gazelle SG (14) 150 g/ha</p>	<p>Traiter dès la plantation en présence de danger d'infection jusqu'au plus tard 14 jours après la plantation.</p> <p>A appliquer préventivement. Au plus tard 15 jours après plantation.</p> <p>Action systémique.</p> <p>Immédiatement après la plantation ou au début de l'attaque.</p> <p>Traiter à l'apparition du ravageur.</p>
<p>Tomates</p> <p>Maladies Mildiou, alternariose, oïdium</p> <p>Mildiou, alternariose et septoriose</p> <p>Moucheture bactérienne</p> <p>Oïdium</p>	<p>Amistar ^① (3) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Slick (3) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Daconil 500 (21) 0,3 % (3 l/ha)</p> <p>Oxycuivre 50 ou Cupro FL (3) 0,5 % (5 kg/ha)</p> <p>Stroby WG (14) 0,05 % (500 g/ha) ou</p> <p>Armicarb (3) 0,5 % (5 kg/ha)</p> <p>Soufralo (3) 0,2 % (2 kg/ha)</p>	<p>En plein champ et sous abri toutes les 2–3 semaines, max. 3 fois par saison. Alternier avec Daconil 500.</p> <p>Traiter au début de l'attaque. Max. 4 applications par saison.</p> <p>Dès la plantation toutes les 2–3 semaines, au total 7–8 traitements en saison.</p> <p>Ne traiter que les tomates en serre.</p> <p>Traiter tous les 8–12 jours.</p> <p>Traitement préventif.</p>

NOUVEAU