

<p>Ravageurs Contre le doryphore</p> <p>Contre le sitone et le puceron du pois</p>	<p>Gazelle SG (14) 100 g/ha</p> <p>Talstar SC (14) 0,1–0,2 l/ha</p>	<p>Effet secondaire contre les pucerons.</p> <p>A appliquer tôt le matin.</p>
<p>Poireaux Désherbage En prélevée Mauvaises herbes annuelles</p> <p>Dicots et graminées annuelles sur plants</p> <p>Contre les graminées</p> <p>Maladies Mildiou (phytophthora), rouille, alternariose (taches pourpres)</p> <p>Ravageurs Teigne, thrips</p> <p>Thrips</p>	<p>Linutop 1,5 l/ha</p> <p>Sitradol SC + Linutop 4 l/ha + 0,4–1 l/ha</p> <p>Select + Zofal R 0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha</p> <p>Amistar ^① (14) 0,1 % (1 l/ha)</p> <p>Slick (14) 0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p>Talstar SC (14) 0,03 % (3 dl/ha)</p> <p>Gazelle SG (14) 0,05 % (500 g/ha) ou</p> <p>Pyrinex (14) 0,3 % (3 l/ha)</p>	<p>De suite jusqu'à 15 jours après la plantation.</p> <p>Traiter peu avant ou jusqu'à 5 jours après la plantation.</p> <p>Traitement sur des graminées levées.</p> <p>En présence de danger d'une attaque à intervalles de 15 jours (max. 4× par saison).</p> <p>Max. 4 applications par saison.</p> <p>Dès l'apparition des ravageurs, de juillet à septembre.</p> <p>Répéter les traitements tous les 8–10 jours.</p> <p>Selon communiqués officiels.</p>
<p>Radis, navets, scorsonères Désherbage En prélevée Dicots et graminées annuelles</p> <p>Maladies Alternariose, mildiou, rouille blanche</p>	<p>Sitradol SC 2–2,5 l/ha</p> <p>Amistar (21) 1 l/ha</p>	<p>Scorsonères: Jusqu'au plus tard 5 jours après le semis.</p> <p>Traitement préventif. Max. 2 applications par saison.</p>