

Mâche (rampon)

Désherbage

En postlevée

Sur adventices levées après le semis

Maladies

Oïdium

Ravageurs

Pucerons

Reglone

3 l/ha

Armicarb (3)

0,5 % (5 kg/ha)

Slick (21)

0,05 % (0,5 l/ha)

Talstar SC (14)

0,03 % (0,3 l/ha)

Avant la levée de la mâche.

Traiter préventivement

Immédiatement après la plantation ou au début de l'attaque.

Traiter à l'apparition du ravageur. Peut être remplacé par **Novo Tak** (0,1 %).

Melons, courgettes

Maladies

Mildiou et oïdium

Oïdium alternariose

Oïdium

Ravageurs (melons)

Pucerons

Amistar[®] (3)

0,1 % (1 l/ha) ou

Stroby WG (14)

0,03 % (0,3 kg/ha)

Slick (21)

0,05 % (0,5 l/ha)

Armicarb (3)

0,5 % (5 kg/ha)

Gazelle SG (14)

0,0125 % (0,125 kg/ha)

A l'apparition des premiers symptômes toutes les 2–3 semaines. Maximum 3 traitements par saison. Délai d'attente: 3 jours.

A appliquer aux premiers symptômes. Seulement sur les courgettes.

Traitement préventif.

Effet systémique.

Petits pois

Désherbage

Postlevée

Sur les graminées levées

Contre les arroches

Maladies

Contre le botrytis, les taches des feuilles et l'oïdium

Sitradol SC

2 l/ha

Select + Zofal R

0,5 l/ha + 1 l/ha

Trifoline

3–4 l/ha

Amistar (14)

1 l/ha

Dès la levée jusqu'à 2 feuilles des mauvaises herbes. En mélange avec Basagran SG 0,8 kg/ha.

Très bonne efficacité contre les pâturins.

Efficace seulement sur les petites arroches. Appliquer seulement jusqu'au stade 6 feuilles des petits pois.

Traitement préventif, peut être mélangé avec des insecticides.