



Légumes divers

Asperges

Désherbage

Dicots et graminées annuelles et vivaces

Maladies

Stemphylium (brûlure des feuilles)

Rouille de l'asperge
Stemphylium (brûlure des feuilles)

Ravageurs

Mouche de l'asperge

Aprex

4–6 kg/ha

Daconil 500

0,3 % (3 l/ha)

Amistar ①

0,1 % (1 l/ha) ou

Fezan

0,15 % (1,5 l/ha)

Stroby WG

0,03 % (0,3 kg/ha)

Slick

0,05 % (0,5 l/ha)

Novo Tak (14)

0,1 % (1 l/ha)

Dès la 4^{ème} année de plantation, traiter avant la «percée» ou après la récolte. Miscible avec Roundup Max (3 l/ha) avant la levée.

Traitement préventif en été et répéter à intervalles de 15 jours. Bien mouiller.

Dès la mi-juillet à l'apparition des 1^{ers} symptômes et répéter à intervalles de 15 jours. Maximum 3 traitements par saison.

NOUVEAU

Traiter immédiatement à l'apparition du ravageur.

Betteraves à salade

Désherbage

En postlevée

Dicots et graminées annuelles

Maladies

Cercosporiose et ramulariose

Bettix SC + Beetup Pro CS

1,5 l/ha + 1 l/ha

Beetup Pro SC + Chloridazon DF

1,5–2 l/ha + 1 kg/ha

Oxycuivre 50 (21) ou Cupro FL

0,5–0,7 % (5–7 kg/ha)

Amistar Xtra (35)

1 l/ha

Slick (14)

0,5 l/ha

En traitement split, sur graminées levées 2–3 applications. Bettix peut être remplacé avec 300 g/ha Venzar.

Au stade 2 feuilles des adventices, en traitements fractionnés.

A l'apparition des premières taches et répéter 1–2 fois à intervalles de 3 semaines.

A appliquer préventivement.