



Colza d'automne

Désherbage

Traitement après le semis

Spécialement contre capselle (bourse à pasteur).

Contre les graminées levées

Contre les ravageurs

Contre les limaces

Contre l'altise

Contre les maladies

Contre phoma en automne et pour une meilleure résistance en hiver

Remarques générales

Semis Postsemis Levée 2 feuilles 4 feuilles 6 feuilles 8 feuilles

Devrinol Top

3 l/ha

Jusqu'à 10 jours après le semis.
La solution idéale dans le colza. Efficace contre le gaillet.

Devrinol Plus

3,5-4 l/ha

A traiter après le semis.

Contre les repousses de céréales et graminées vivaces.

Select + Zofal R

0,5 l/ha

1 l/ha

Métarex TDS

5 kg/ha

Selon le temps et la population de limaces, répéter plusieurs fois l'application.
4 l/ha Mollux FL lors d'attaque virulente.

Efficacité rapide également par basses températures.

Talstar SC

0,2 l/ha

NOUVEAU

Application début octobre sur colza en pleine croissance. L'application a un effet de raccourcissement et améliore la résistance en hiver.

Fezan

1-1,5 l/ha

Possibilité de remplacement de culture de colza au printemps.

Sans labour ● Devrinol Top Pommes de terre, colza de printemps, haricots, soja, tournesol, choux et tabac
Après labour ● Devrinol Top Maïs, féverole, pois, blé de printemps



Colza de printemps

Désherbage

Contre les graminées levées à la reprise de la végétation

Contre les ravageurs

Contre charançon de la tige

Contre les méligèthes

Contre les méligèthes, l'alternative aux pyréthrinoïdes

Contre les maladies

Contre phoma

Contre la sclérotiniose

Pour une nutrition optimale

Stimule la nutrition, favorise la croissance

Engrais foliaire

Formation de rosettes Croissance Boutons floraux Préfloral Pleine floraison

Select + Zofal R
0,5 l/ha + 1 l/ha

Talstar SC
0,2 l/ha

Talstar SC
0,2 l/ha

Gazelle SG
150 g/ha

Capitan S ou Amistar
1 l/ha

Amistar ou Amistar Xtra ou Fezan
1 l/ha 1 l/ha 1,5 l/ha

Goëmar Multi
3 l/ha

Engrais liquide S
5-10 l/ha

Efficace aussi par basses températures.

Miscible au traitement contre charançon de la tige

Observer un bon mouillage de la plante. 300-400 l de bouillie par ha donnent d'excellents résultats. Sticker 0,3 l/ha améliore l'adhérence de la bouillie.

NOUVEAU

Traiter au début de la floraison. Miscible avec Goëmar Multi.

Favorise la croissance des siliques et la formation des grains. En mélange avec insecticides et fongicides.