

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Fermeture des grappes
Contre le mildiou, l'oïdium et le rougeot		Olymp Duplo DF 0,15 % (1,5–2,4 kg/ha)				
Contre le mildiou				Amarel Cuivre DF 0,25 % (4 kg/ha)		
Contre le mildiou et l'oïdium Efficacité partielle sur le botrytis				Olymp Cupro 0,2 % (2,4–3,2 kg/ha)		
Peut être ajouté à d'autres fongicides.		Cupro FL ou Oxycuivre 50 ou Kocide 2000 0,15% (1,2–2,4 l/ha) 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha) 0,125–0,4 % (1,5–6 kg/ha)				NOUVEAU
Contre le botrytis		Miscible avec les fongicides. Appliquer avant la fermeture des grappes.		Cercobin 0,17 % (2 l/ha)		
				Traitement suivi après Cercobin. Jusqu'au début véraison.	Frupica SC 0,1 % (1,2 l/ha)	
Mouillant et adhésif pour fongicides	Sticker 0,1 l/100 l d'eau					
Remarques importantes	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour obtenir une bonne efficacité, la quantité de produit d'une part et une technique d'application impeccable d'autre part sont décisives. ● Les recommandations indiquées correspondent aux exigences d'Agroscope Changins-Wädenswil. ● Max. 3 traitements par saison avec Olymp 10 EW, Olymp Duplo, Quadris Max, Fantic F, Vincare, Talendo. Cyflamid 2 traitements. 					

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison
Contre pyrale de la vigne, cicadelle verte, noctuelle, boarmie des bourgeons	Steward 0,0125 % (125 g/ha)				
Contre les œufs d'acariens	Trévi 0,05 % (0,75 kg/ha)				
Contre le vers de la grappe 1 ^{ère} et 2 ^{ème} génération		Répéter l'application lors de vol persistant.		Steward 0,0125 % (150 g/ha) ou Pyrinex 0,15 % (1,8–3 l/ha)	
Pour une nutrition optimale					
Stimule la croissance et favorise la nutrition	Augmente la résistance de la plante.	Goëmar Start 3×2 l/ha			3 applications jusqu'à fin floraison.
Fumure foliaire d'appoint		Engrais liquide S 4 l/ha par application			
Contre le dessèchement de la rafle		1 ^{ère} application dès la chute des capuchons.		Calshine 3 l/ha	