



Vigne

Contre les maladies

Contre l'excoriose, le rougeot,
le mildiou

Daconil 500
0,3 % (2,4 l/ha)

Bien mouiller les plantes.

Contre le mildiou

Amarel Folpet DF
0,15 % (1,5–2,4 kg/ha)

Contre le mildiou et l'oïdium
Efficacité partielle sur
le botrytis

Quadris Max
0,2 % (1,6–3,2 l/ha)

Contre le mildiou

Fantic F
0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)

Contre le mildiou

Fongicide transsystémique.

Vincare
0,2 % (1,6–3,2 kg/ha)



Contre l'oïdium

Soufralo
0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha)

ou

Talendo
0,025 % (0,2–0,4 l/ha)

ou

Cyflamid
0,03 % (0,24–0,48 l/ha)

Tous les produits sont miscibles avec nos produits contre le mildiou.

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Fermeture des grappes
Contre le mildiou, l'oïdium et le rougeot		Olymp Duplo DF 0,15 % (1,5–2,4 kg/ha)				
Contre le mildiou				Amarel Cuivre DF 0,25 % (4 kg/ha)		
Contre le mildiou et l'oïdium Efficacité partielle sur le botrytis				Olymp Cupro 0,2 % (2,4–3,2 kg/ha)		
Peut être ajouté à d'autres fongicides.		Cupro FL ou Oxycuivre 50 ou Kocide 2000 0,15% (1,2–2,4 l/ha) 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha) 0,125–0,4 % (1,5–6 kg/ha)				NOUVEAU
Contre le botrytis		Miscible avec les fongicides. Appliquer avant la fermeture des grappes.		Cercobin 0,17 % (2 l/ha)		Frupica SC 0,1 % (1,2 l/ha)
Mouillant et adhésif pour fongicides	Sticker 0,1 l/100 l d'eau					
Remarques importantes	<ul style="list-style-type: none"> ● Pour obtenir une bonne efficacité, la quantité de produit d'une part et une technique d'application impeccable d'autre part sont décisives. ● Les recommandations indiquées correspondent aux exigences d'Agroscope Changins-Wädenswil. ● Max. 3 traitements par saison avec Olymp 10 EW, Olymp Duplo, Quadris Max, Fantic F, Vincare, Talendo. Cyflamid 2 traitements. 					