



## Vigne

### Désherbage

Solution parfaite y compris pour la prêle et les liserons

#### Chikara 25 WG + Exell + Roundup Max

150–200 g/ha + 0,5 l/ha + 2,5 l/ha

Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. Effet foliaire et résiduaire. Applications dès début avril jusqu'à mi-mai. Avant débourrement ou en sous-foliaire, traiter la prêle dès fin juillet. Dosage 200 g/ha. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Prudence sur nouvelles plantations.

Herbicide résiduaire

#### Chikara 25 WG + Linutop + Exell

200 g/ha + 3 l/ha + 0,5 l/ha

A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Mélange possible avec Chikara + Exell avec 4 l/ha.

Mélange prêt à l'emploi

#### Alce

6 l/ha

Eviter la dérive. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Très bonne efficacité contre amarante et morelle noire. Traitement jusqu'au 15 juin.

Contre les graminées levées

#### Select + Zofal R

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Contre chiendents 1 l/ha.

Herbicide total

#### Roundup Max

4–7,5 l/ha

### Contre les ravageurs

Contre l'acariose, l'érinose de la vigne, la cicadelle de la vigne, le phylloxera, la pyrale de la vigne, la cochenille

#### Oleo Diazinon R

0,5 % (4–5 l/ha)

A appliquer lors de température supérieure à 12 °C. Bien mouiller les plantes.

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison
Désherbage	<p><b>Chikara 25 WG + Exell + Roundup Max</b> 150–200 g/ha + 0,5 l/ha + 2,5 l/ha</p> <p>Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. Effet foliaire et résiduaire. Applications dès début avril jusqu'à mi-mai. Avant débourrement ou en sous-foliaire, traiter la prêle dès fin juillet. Dosage 200 g/ha. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Prudence sur nouvelles plantations.</p>				
Herbicide résiduaire	<p><b>Chikara 25 WG + Linutop + Exell</b> 200 g/ha + 3 l/ha + 0,5 l/ha</p> <p>A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Mélange possible avec Chikara + Exell avec 4 l/ha.</p>				
Mélange prêt à l'emploi	<p><b>Alce</b> 6 l/ha</p> <p>Eviter la dérive. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Très bonne efficacité contre amarante et morelle noire. Traitement jusqu'au 15 juin.</p>				
Contre les graminées levées	<p><b>Select + Zofal R</b> 0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha</p>			<p>Contre chiendents 1 l/ha.</p>	
Herbicide total	<p><b>Roundup Max</b> 4–7,5 l/ha</p>				
Contre les ravageurs	<p><b>Oleo Diazinon R</b> 0,5 % (4–5 l/ha)</p> <p>A appliquer lors de température supérieure à 12 °C. Bien mouiller les plantes.</p>				

	Débourrement	Pousses 5 cm	Préfloraison	Floraison	Postfloraison
Contre pyrale de la vigne, cicadelle verte, noctuelle, boarmie des bourgeons	<b>Steward</b> 0,0125 % (125 g/ha)				
Contre les œufs d'acariens	<b>Trévi</b> 0,05 % (0,75 kg/ha)				
Contre le vers de la grappe 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> génération		Répéter l'application lors de vol persistant.		<b>Steward</b> 0,0125 % (150 g/ha) ou <b>Pyrinex</b> 0,15 % (1,8–3 l/ha)	
<b>Pour une nutrition optimale</b>					
Stimule la croissance et favorise la nutrition	Augmente la résistance de la plante.	<b>Goëmar Start</b> 3×2 l/ha			3 applications jusqu'à fin floraison.
Fumure foliaire d'appoint		<b>Engrais liquide S</b> 4 l/ha par application			
Contre le dessèchement de la rafle		1 <sup>ère</sup> application dès la chute des capuchons.		<b>Calshine</b> 3 l/ha	