



## Vigne

### Désherbage

Solution parfaite y compris pour la prêle et les liserons

#### **Chikara 25 WG + Exell + Roundup Max**

150–200 g/ha + 0,5 l/ha + 2,5 l/ha

Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. Effet foliaire et résiduaire. Applications dès début avril jusqu'à mi-mai. Avant débourrement ou en sous-foliaire, traiter la prêle dès fin juillet. Dosage 200 g/ha. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Prudence sur nouvelles plantations.

Herbicide résiduaire

#### **Chikara 25 WG + Linutop + Exell**

200 g/ha + 3 l/ha + 0,5 l/ha

A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Mélange possible avec Chikara + Exell avec 4 l/ha.

Mélange prêt à l'emploi

#### **Alce** 6 l/ha

Eviter la dérive. A appliquer dès la 4<sup>ème</sup> année de plantation. Très bonne efficacité contre amarante et morelle noire. Traitement jusqu'au 15 juin.

Contre les graminées levées

#### **Select + Zofal R**

0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha

Contre chiendents 1 l/ha.

Herbicide total

#### **Roundup Max**

4–7,5 l/ha

### Contre les ravageurs

Contre l'acariose, l'érirose de la vigne, la cicadelle de la vigne, le phylloxera, la pyrale de la vigne, la cochenille

#### **Oleo Diazinon R**

0,5 % (4–5 l/ha)

A appliquer lors de température supérieure à 12 °C. Bien mouiller les plantes.

Débourrement

Pousses 5 cm

Préfloraison

Floraison

Postfloraison