

<p><b>Céleris</b>  <b>Dés herbage</b>  <b>En prélevée</b>            Graminées et dicots annuelles</p> <p><b>Maladies</b>            Septoriose</p> <p><b>Ravageurs</b>            Mouche de la carotte (en arrosage)            Mouche de la carotte (en saison)</p>	<p><b>Sitradol SC + Linutop</b>            2–3 l/ha + 0,4–1 l/ha</p> <p><b>Amistar</b> (14)            0,1 % (1 l/ha)</p> <p><b>Slick</b> (14)            0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p><b>Daconil 500</b> (21)            0,3 % (3 l/ha)</p> <p><b>Novo Tak</b> (14)            0,1 % (1 l/ha)</p> <p><b>Talstar SC</b> (28)            0,05 % (0,5 l/ha)</p>	<p>Traiter peu avant ou immédiatement après la plantation.</p> <p>Après la plantation et répéter toutes les 3–4 semaines.</p> <p>1–2 dl de bouillie par plante après la reprise.</p> <p>Durant le vol, traiter tous les 10–15 jours; selon avis des stations officielles.</p>
<p><b>Choux (toutes les variétés)</b>  <b>Dés herbage</b>  <b>Avant plantation</b>            Dicots et graminées annuelles</p> <p><b>Après plantation</b>            Dicots et graminées annuelles</p> <p>Contre graminées</p> <p><b>Maladies</b>            Maladie des taches noires du chou – Alternariose</p> <p>Taches des feuilles, oïdium            Rouille blanche</p> <p>Nervures noires du chou</p> <p><b>Ravageurs</b>            Pucerons</p> <p>Pucerons, teigne, charançon, gallicole, cécidomyie, mouche blanche, noctuelle, piéride</p> <p>Noctuelle du chou, piéride de la rave, mouche blanche</p>	<p><b>Sitradol SC</b>            4–5 l/ha</p> <p><b>Devrinol Plus</b>            4 l/ha ou</p> <p><b>Centium 36 CS</b>            0,25 l/ha</p> <p><b>Select + Zofal R</b>            0,5–1 l/ha + 1–2 l/ha</p> <p><b>Slick</b> (14)            0,05 % (0,5 l/ha)</p> <p><b>Amistar</b> (14)            1 l/ha</p> <p><b>Oxycuivre 50</b> (7)            2 kg/ha</p> <p><b>Roxion</b> (21)            0,6 l/ha</p> <p><b>Talstar SC</b> (14)            0,03 % (0,3 l/ha)</p> <p><b>Steward</b> (14)            0,85 % (85 g/ha)</p>	<p>Sur sol léger et mi-lourd 40 ml/a, sol lourd et humifère 50 ml/a.</p> <p>Traiter après la plantation et arroser.</p> <p>Traiter après la plantation. En mélange avec un partenaire.</p> <p>Traitement sur des graminées levées.</p> <p>Traitement préventif du chou. Max. 4 × par saison.</p> <p>Traitement préventif. Max. 3 × par saison.</p> <p>A appliquer tôt en automne.</p> <p>Traiter au début de l'attaque.</p> <p>Traiter à l'apparition du ravageur. Contre la cécidomyie pendant le vol.</p>

**NOUVEAU**