

Altise	Pyrinex (14) 0,3 % (3 l/ha)	Traiter à l'apparition du ravageur.
Piéride	Nomolt (14) 0,03 % (0,3 l/ha)	Traiter à l'apparition du ravageur. Bien mouiller et répéter si nécessaire.
Croissance Engrais foliaire	Engrais liq. S 0,4 % (4 l/ha)	Miscible avec nos fongicides et insecticides.
Concombres, cornichons Maladies Taches anguleuses et mildiou	Oxycuivre 50 0,2 % (2 kg/ha) ou Cupro FL (3) 0,5 % (5 l/ha) Kocide 2000 (21) 0,2 % (2 kg/ha)	Attention! Danger de brûlures.
Oïdium	Armicarb 0,5 % (5 kg/ha)	2–3 applications, dans un délai de 7 jours. Délai d'attente 3 jours.
Mildiou et oïdium	Amistar ^① (3) 0,1 % (1 l/ha) ou Stroby WG (3) 0,03 % (0,3 kg/ha)	En présence de danger d'infection toutes les 2–3 semaines. Maximum 3 fois par saison. Délai d'attente: 3 jours.
Gombose Ravageurs Pucerons, thrips et mouches blanches	Slick 0,05 % (0,5 l/ha) Talstar SC (14) 0,03 % (3 dl/ha)	Seulement pour les cultures couvertes. Traiter à l'apparition des ravageurs.
Epinards Désherbage En prélevée En mélange immédiatement après le semis	Centium 36 CS 0,15 l/ha + Venzar 600 g/ha	Ne pas traiter les épinards d'hiver.
En postlevée Adventices annuelles Ravageurs Pégomyie (mouches de la betterave)	Beetup 3×1–1,5 l/ha Novo Tak (14) 0,1 % (1 l/ha)	1 ^{ère} application au stade 2 feuilles et répéter 5–7 jours plus tard. 1 fois sur feuilles complètement développées et répéter 1–2 fois à intervalles de 15 jours.
Fenouil Désherbage Dicots et graminées annuelles	Sitradol SC 2–4 l/ha	Fenouil semé: De suite jusqu'à 5 jours après le semis sur sol fin et modérément humide. Fenouil planté: Peu avant la plantation. Sol léger 20 ml/a (à ne pas dépasser), sol tourbeux 40 ml/a.
Maladies Mildiou, Cercospora, Ramularia	Amistar ^① 1 l/ha	Selon les conditions. Au max. 3 traitements par an. Délai d'attente: 7 jours.

NOUVEAU

NOUVEAU