



Légumes oignons

Désherbage

Traitement avant semis

Roundup Max
4 l/ha

Par bon ensoleillement 1 jour avant le semis des oignons.
Contre les mauvaises herbes à problème.

Traitement prélevée

Sitradol SC
1-2 l/ha

Immédiatement après le semis, évent. en mélange avec Ramrod.
Sur sol léger, max. 1 l/ha. Pour les oignons à repiquer, ajouter Linutop 1 l/ha.

Postlevée

Sitradol SC
0,5-1,5 l/ha

En traitement split, au stade fouet seul ou en mélange avec Topper.
Adapter le dosage à la grandeur de la culture.

Contre les paturins et autres

Select + Zofal R
0,5-1 l/ha + 1-2 l/ha

Très bonne efficacité contre les paturins
0,5 l/ha.

Maladies

Mildiou

Amistar
1 l/ha

Application préventive au début de la saison,
max. 3 applications/saison.
Action stimulante de la plante.

Fongicide de contact contre
le mildiou

Fongicides de contact avec bonne résistance
au lessivage.

Daconil 500
3 l/ha

ou

Zignal
0,5 l/ha

NOUVEAU

A appliquer pendant la période de croissance principale. Ne pas
mélanger avec des produits avec formulation EC. Max. 3 × par saison.

Fandango
1,25 l/ha

Action transsystémique. Application stoppante en mélange avec
Fandango 1,25 l/ha. Max. 3 × par saison.

Valbon
1,6 kg/ha

Cladosporiose
Taches pourpres

Slick
0,5 l/ha

A appliquer au début de l'attaque.
Max. 4 × par saison.

Botrytis des feuilles
Pourriture de l'oignon

1 traitement début juillet, ensuite continuer
préventivement avec d'autres produits.

Frupica SC
1 l/ha

Semis

Fouet

2-8 feuilles

Formation
du bulbe 21 juin

Maturité

Récolte