

# Guida viticola








































## TICINO 2006



 **Stähler**

[www.staehler.ch](http://www.staehler.ch)

# Stähler Piano dei trattamenti viticoltura 2006

Stadio fenologico	Malattie e insetti							Applicazione fitosanitari	Atomizzatore	Osservazioni	Note	
	Erinosi Acariosi	Escoriosi	Boarmia Nottue	Rosore parassitario	Oidio	Peronospora	Botrytis	Qtà/ha	500 m <sup>2</sup>	 : Buona efficacia  : Efficacia parziale		
								<b>Endosulfanol® R + Soufralo®</b>	4-5 l 4,0 kg	2,5 dl 200 g	Contro la nottua e la boarmia, Steward 125g/h	
								<b>Daconil® 500 + Soufralo®</b>	2,4 l 4,0 kg	1,2 dl 200 g	Daconil® 500, grande resistenza al dilavamento	
								<b>Olymp® Duplo</b>	1,2 kg	60 g	Per les triazoles (ISS) non sorpassare 3 applicazioni all'anno	
								<b>Vincare® + Talendo® + Goemar® Star</b>	2,0 kg 2,5 dl 3,0 l	100 g 0,13 dl 1,5 dl	Su erbe già ben sviluppate. Speciale per coda cavallina <b>Alge Goemar Star</b> . 3 volte, 3 litri assieme ai applicazioni fitosanitari in zone di cattiva fecondazione	
								<b>Quadris® Max + Goemar® Star</b>	2,4 l	1,2 dl	Max 3 applicazioni annue. Miscibile con Oxycuivre® 50 o Soufralo®	
								<b>Frupica® SC o altro anti botritico</b>	1,2 l	0,6 dl		
								<b>Vincare® + Talendo®</b>	3,2 kg 4,0 dl	160 g 0,2 dl	Talendo® non sorpassare 3 applicazioni all'anno Vincare® non sorpassare i 4 trattamenti annue.	
								<b>Olymp® Duplo + Oxycuivre® 50</b>	2,4 kg 1 kg	120 g 50 g	Contro la tignola della seconda generazione Steward 150 g/ha o Pynex 3 l/ha.	
								<b>Frupica® SC o altro anti botritico</b>	1,2 l	0,6 dl		
								<b>Vincare® + Talendo® + Oxycuivre® 50</b>	3,2 kg 4,0 dl 1 kg	160 g 0,2 dl 50 g		
	Erbicida							<b>Chikara® 25 WG + Alce®</b>	150 g 4 l	8 g 2 dl	Chikara® 25 WG su viti dopo il 4° anno	<b>Vendita per:</b>  FELA, 6593 Cadenazzo FELA, 6850 Mendrisio
								<b>Chikara® 25 WG + Roundup Max®</b>	200 g 2,5 l	10 g 1,25 dl	Roundup Max® applicazione, 3 semaines après les plaies de taille	
								<b>Alce®</b>	6 l	3 dl	Alce agisce tramite le foglie e le radici	

Per una corretta utilizzazione dei prodotti, fanno fede, unicamente le indicazioni d'impiego, figuranti su o negli imballaggi.



# VINCARE®

## Fungicida trans-sistemico



- La materia attiva penetra rapidamente nelle cellule spandendosi nei tessuti del vegetale.
- La ripartizione sistemica è assicurata, in gran parte della pianta dalla circolazione della linfa.
- Il Bentiavalicarb-isopropyl agisce in modo preventivo e curativo: la sostanza attiva impedisce la germinazione delle spore, distrugge i tubi germinativi ed il micelio già presente nei tessuti impedendone la sporulazione.

- **Assorbimento rapido e ripartizione omogenea in gran parte della pianta**
- **Migliore efficacia dovuta alle due sostanze translaminari**
- **Ottima persistenza alla pioggia**
- **Ottimo grado d'efficacia di lunga durata**
- **Atto alla combinazione con altre sostanze attive**



Famiglia chimica  
 Agisce contro  
 Classe di fungicida  
 Fabbricante

Aminoacidi carbamati  
 La peronospora sulle foglie ed i grappoli  
 Transsistemico 100% translaminare e circa 60% sistemico  
 Kumiai Chemical Industry, Japon



# QUADRIS MAX

## Efficace, semplice e collaudato

Un solo prodotto antiperonosporico e anti oidico avente una buona efficacia parziale contro il Botrytis.

Il vostro vantaggio:

- Un fungicida sperimentato da anni
- Facile utilizzazione per una grande sicurezza e risparmio di tempo
- Formulazione liquida facilmente dosabile
- Quadris Max è miscibile con molti altri prodotti

**QUADRIS MAX può essere applicato a partire dalla fioritura fino all'invaiaatura**

Il miglior stadio d'applicazione: 2 trattamenti durante la fioritura

**Con QUADRIS MAX sei più tranquillo fino alla vendemmia**



Stähler Suisse SA, 4800 Zofingen  
 Tel. 062 746 80 00, Fax 062 746 80 08  
 www.staehler.ch