

# TopPhos

## Flüssiger P-Dünger zur Optimierung der Wurzelentwicklung

### Kurzbeschreibung

TopPhos Markenblattdünger dient zur Ansäuerung und Optimierung der Wurzelentwicklung. Die Phosphorsäure gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit von Phosphor, da diese verstoffwechselt werden kann. Durch die Anwendung von TopPhos Markenblattdünger wird die Wurzelentwicklung und das Wurzelwachstum gefördert und somit die Qualität und der Ertrag abgesichert.

### Wirkstoffe

Phosphorpentoxid (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>): 30,5 %  
Kaliumoxid (K<sub>2</sub>O): 5,1 %  
Magnesiumoxid (MgO): 5,5 %

### Formulierung

Wasserlösliches Konzentrat (SL)

### Anwendung Feldbau

#### Feldbau allgemein

**Dosierung** : 2–5 l/ha

**Kartoffeln** : 3–5 l/ha mit 1. und 2.  
Fungizidbehandlung

**Raps** : 2–4 l/ha im Herbst oder Frühjahr

**Getreide** : 2–5 l/ha im Schossenstadium

### Auflagen

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden.

### Mischbarkeit

TopPhos ist mit Pflanzenschutzmitteln mischbar.  
Nicht mit hoch-alkalischen Produkten mischen.

### Anbauprogramm

Richtlinien für IP (ÖLN) und LABEL-Produktion beachten.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Verbindlich für die richtige Anwendung ist die aufgedruckte oder die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

### Mittelreste und Leergebinde

Mittelreste und Leergebinde zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

### Lagerung

Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen, Nicht unter 5°C lagern. An einem kühlen, gut durchlüfteten Ort lagern. Nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzen oder in der Nähe direkter Hitzequellen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Die Lagerung beim und der Transport zum Anwender unterliegen nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

### Hinweise für den Käufer

Wir gewährleisten, dass die Zusammensetzung des Produktes in der verschlossenen Originalverpackung den auf dem Etikett gemachten Angaben entspricht. Für irgendwelche direkte oder indirekte Folgen aus unsachgemässer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung des Produktes, mangelhafter Applikationsqualität und Nichteinhaltung der guten

landwirtschaftlichen Praxis, sind wir nicht verantwortlich. Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z.B. Bodenbeschaffenheit, Pflanzensorten und Witterungsverhältnisse können zur Folge haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen an den behandelten Kulturpflanzen entstehen. Für solche Schäden haften wir nicht.

### Signalwort

ACHTUNG

### H-Sätze

**H315** Verursacht Hautreizungen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **H412** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### P-Sätze

**P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P264** Nach Handhabung Hände gründlich waschen.

**P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**P280** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

**P305+P351+P338** BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**P501** Inhalt/Behälter sind einer gesicherten Entsorgung zuzuführen.



GHS07

### Notfallauskunft bei Vergiftungen

Toxikologisches Informationszentrum Zürich, Telefon 145 oder 044 251 66 66.

### Packungsgrösse

10 06 39 Einzelpackung zu 10 l

### Kontakt

Stähler Suisse SA

Henzmannstrasse 17 A

4800 Zofingen

Tel: 062 746 80 00

info@staehler.ch

<http://www.staehler.ch>