Kartoffeln

Längenwachstum	Schliessen des Bestandes	Blüte	Verholzen der Stängel	Abreife

Standardbehandlungen gegen Kraut- und Knollenfäule

Der Wachstumsphase angepasst

- **Amistar** 0,75 l/ha + **Sporex** 0,25 kg/ha — Max. 3 Behandlungen.
- **Eleto** 1 l/ha + **Leimay** 0,5 l/ha + **Slick** 0,5 l/ha — Max. 3 Behandlungen.
- **Nospor Combi** 0,6 l/ha
- **Eleto** 1 l/ha

Kontaktfungizide

- **Leimay** 0,5 l/ha
- **Zignal** 0,4 l/ha
- **Bordeaux S** 6–8 kg/ha oder **Kocide 2000** 3 kg/ha

Max. 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr

Mischpartner bei hohem Alternariadruck

Alternaria

- **Amistar** 0,75 l/ha

Vorbeugend, frühzeitig einsetzen; kombinierbar mit Produkten gegen Krautfäule.

- **Slick** 0,5 l/ha

Stoppbehandlungen bei Krautfäulebefall oder bei hohem Infektionsdruck

Bei Krautfäulebefall, Behandlungen nach 3–5 Tagen wiederholen. Zignal und Leimay sind geeignete Mischpartner bei hohem Krankheitsdruck.
Leimay hat eine ausgeprägte antisporulierende Wirkung.

- **Leimay** 0,5 l/ha + **Nospor Combi** 0,6 l/ha

nach 3 bis 5 Tagen

- **Zignal** 0,4 l/ha (oder Leimay 0,5 l/ha) + **Eleto** 1 l/ha

UV- und Verdunstungsschutz

Sonnenschutz vorbeugend/früh bei Trockenheit und grosser Hitze

- **Lufix** 2 l/ha
- **Surround** 6–12 kg/ha + **Lufix** 2 l/ha

mit Zignal und Leimay gut mischbar

Wichtige Hinweise

- Fungizid-Intervalle sind generell dem Neuzuwachs und der Niederschlagsmenge anzupassen.
- Calshine 2 × 2,5 l/ha als Zusatz im Hauptwachstum zur Ca-Versorgung; hemmt Wachstumsrisse.
- Anti-Mousse als Zusatz reduziert die Schaumbildung.